Santé Canada Health Canada

# Le VIH et le sida au Canada

## Rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998

Avril 1999

Canada

101-03114/

Notre mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à maintenir et à améliorer leur état de santé.

*Santé Canada*

Publication autorisée par le ministre de la Santé
© Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux 1999
ISSN 1488-1934

# Le VIH et le sida au Canada

## Rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998

**Division de la surveillance du VIH/sida**
**Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose**
**Laboratoire de lutte contre la maladie**
**Direction générale de la protection de la santé**
**Santé Canada**

**avril 1999**

On peut se procurer le présent rapport de plusieurs façons :

**Par la poste :**
À la Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, Laboratoire de lutte contre la maladie, Santé Canada, pré Tunney, Ottawa (Ontario) Canada K1A 0L2, indice de l'adresse : 0900B1;

ou :

Au Centre national de documentation sur le sida, Association canadienne de santé publique, 1565, avenue Carling, bureau 400, Ottawa (Ontario) Canada K1Z 8R1; tél.: (613) 725-3769, fax : (613) 725-9826

**Par Internet :**
**Le VIH et le sida au Canada** peut être consulté dans les deux langues officielles sur Internet : on peut y avoir accès au moyen d'un fureteur Web à l'adresse **http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/public_f.html** (choisir Publications périodiques, et ensuite, Le VIH et le sida au Canada).

**Par télécopieur :**
On peut également avoir accès aux documents par télécopieur au moyen du système FAXLINK : il suffit de composer le (613) 941-3900 après avoir décroché le combiné de l'appareil. Des instructions détaillées sont fournies à **l'annexe 1.**

This report is also available in English.

---

## BUREAU DU VIH/SIDA, DES MTS ET DE LA TUBERCULOSE

| | | |
|---|---|---|
| Directeur | Don Sutherland, MD, MComm H, M.Sc., (Épid.) | (613) 957-1777 |
| **Division de la surveillance du VIH/sida** | | |
| Chef | Poste vacant | (613) 946-0461 |
| Soutien administratif | Cathy Brims | (613) 954-5148 |
| **Unité de la surveillance du VIH et du sida** | | |
| Chef p. i. | Jason Sutherland, M.Sc. | (613) 954-1320 |
| Adjoint de recherche | Norman Cameron, B.A. | (613) 954-3273 |
| Adjointe de recherche | Teresa Wilk, B.A. | (613) 941-3140 |
| Analyste de recherche | Adrian Dalloo, B.Sc., B.A. | (613) 957-1816 |
| Analyste de recherche | Maureen Mathias, B.A. | (613) 954-5587 |
| Étudiante inscrite à un programme de coopération | Sandra Burton | |
| **Unité des modélisations statistiques et des projections** | | |
| Chef | Ping Yan, Ph.D. | (613) 954-5149 |

---

**Remerciements** : Nous désirons remercier les coordonnateurs provinciaux et territoriaux des programmes sur le VIH/sida, les laboratoires, les dispensateurs de soins et les médecins participants de nous avoir fourni les données confidentielles non nominatives grâce auxquelles ce rapport a pu voir le jour. Nous tenons aussi à souligner la contribution de la Division de la diffusion de la documentation du LLCM, qui a révisé et produit le document, qui l'a imprimé et affiché sur Internet.

Nous remercions enfin M^me^ Cathy Brims, M^me^ Sandra Burton, M. Norman Cameron, M^me^ Teresa Wilk, M. Adrian Dalloo, M^me^ Maureen Mathias et M. Pete Vaino pour l'aide qu'ils ont apportée à la réalisation de ce rapport.

**N.B.** Pour l'utilisation *de toute information* tirée de ce document, il faut en mentionner la source.

**Citation suggérée** : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : Rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, Santé Canada, 1999.

# Informations à l intention des lecteurs du rapport «Le VIH et le sida au Canada»

La Division de la surveillance du VIH/sida du Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose du Laboratoire de lutte contre la maladie (LLCM), Santé Canada, est heureuse de vous présenter le rapport de surveillance intégrée du VIH/sida en date du 31 décembre 1998.

Cette publication intitulée *Le VIH et le sida au Canada* réunit les renseignements autrefois présentés dans deux rapports distincts, *Le VIH au Canada* et *Le sida au Canada*, et témoigne de l'approche intégrée adoptée pour la surveillance du VIH et du sida.

En réponse aux demandes de renseignements sur l'origine ethnique, nous avons inclus ces données dans ce rapport (voir le tableau 17, page 40). Ces éléments d'information sont fondés sur les données systématiquement recueillies par les médecins sur l'origine ethnique des personnes atteintes du sida, depuis le début de l'épidémie. En gros, les données signalées ici rendent compte de presque 80 % des cas de sida, et on envisage actuellement d'améliorer la déclaration de ce genre de données.

La Division de la surveillance du VIH/sida s'efforce sans cesse d'améliorer le rapport pour mieux refléter l'évolution des besoins de surveillance de la maladie. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments respectueux.

Dr Don Sutherland, MD, MComm H, M.Sc. (Épid.)
Directeur, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose
Laboratoire de lutte contre la maladie

M Jason Sutherland, B.A., M.Sc.
Chef p.i., Unité de la surveillance du VIH/sida
Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose

M. Ping Yan, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
Chef, Unité des modélisations statistiques et des projections
Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose

# Table des matières


Observations sur la surveillance des tests positifs pour le VIH et sur les diagnostics de sida 1

Notes techniques – Catégorie d'exposition 3

**SECTION I**
**Le VIH au Canada — Tests positifs pour le VIH au Canada** 4

**Tableau 1.** Nombre de tests positifs pour le VIH au Canada, par année du test, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1999; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 4

**Tableau 2.** Nombre cumulatif de tests positifs pour le VIH signalés chez les adultes et les enfants du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998, par sexe, au Canada; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 5

**Tableau 3A.** Nombre de tests positifs pour le VIH par groupe d'âge et année du test chez les hommes au Canada du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 6

**Tableau 3B.** Nombre de tests positifs pour le VIH par groupe d'âge et année du test chez les femmes au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 7

**Tableau 3C.** Nombre de tests positifs pour le VIH par groupe d'âge et année du test au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 8

**Tableau 4A.** Nombre de tests positifs pour le VIH par catégorie d'exposition et année du test chez les hommes adultes au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 9

**Tableau 4B.** Nombre de tests positifs pour le VIH par catégorie d'exposition et année du test chez les femmes adultes au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 10

**Tableau 4C.** Nombre de tests positifs pour le VIH par catégorie d'exposition et année du test, chez les adultes au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 11

**Tableau 4D.** Nombre de tests positifs pour le VIH par catégorie d'exposition et année du test, chez les enfants au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 12

**Tableau 4E.** Nombre de tests positifs pour le VIH par catégorie d'exposition et par groupe d'âge au Canada, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 13

**Tableau 5A.** Nombre cumulatif de tests positifs pour le VIH par province/territoire et par sexe au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 14

**Tableau 5B.** Nombre de tests positifs pour le VIH par province/territoire et année du test au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 15

**Tableau 6.** Nombre de tests positifs pour le VIH par catégorie d'exposition et par province/territoire au Canada, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 16

**SECTION II**
**Rapport du Programme de surveillance périnatale du VIH au Canada** 17

**Tableau 7.** Nombre cumulatif de nourrissons exposés au VIH pendant la période périnatale au Canada, par région géographique et état sérologique actuel, 1984-1998 18

**Tableau 8.** Nombre de nourrissons exposés au VIH pendant la période périnatale au Canada, par année de naissance et état sérologique actuel, 1984-1998 19

**Tableau 9.** Nombre de nourrissons exposés au VIH pendant la période périnatale au Canada par année de naissance et catégorie d'exposition de la mère, 1984-1998 20

**SECTION III**
**Le sida au Canada – Surveillance du sida jusqu'au 31 décembre 1998** 21

**Tableau 10.** Nombre de cas de sida déclarés, par année de diagnostic jusqu'au 31 décembre 1998, Canada; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999 23

**Tableau 11.** Nombre de cas de sida déclarés et total cumulatif par année de diagnostic et par sexe chez les adultes au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 24

**Tableau 12.** Nombre de cas de sida déclarés chez les enfants et les adultes, par groupe d'âge et par sexe au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 25

**Tableau 13A.** Nombre de cas de sida déclarés par groupe d'âge et par année de diagnostic chez les hommes au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 26

**Tableau 13B.** Nombre de cas de sida déclarés par groupe d'âge et par année de diagnostic chez les femmes au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 27

**Tableau 13C.** Nombre de cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998 et répartition en pourcentage, par groupe d'âge et année du diagnostic au Canada, dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 28

**Tableau 14A.** Nombre de cas de sida et distribution en pourcentage par catégorie d'exposition et par année de diagnostic chez les adultes de sexe masculin au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 29

**Tableau 14B.** Nombre de cas de sida et distribution en pourcentage par catégorie d'exposition et par année de diagnostic chez les adultes de sexe féminin au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 30

**Tableau 14C.** Nombre de cas de sida et distribution en pourcentage par catégorie d'exposition et par année de diagnostic chez les adultes au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 31

**Tableau 14D.** Nombre de cas de sida et distribution en pourcentage par catégorie d'exposition et par année de diagnostic chez les enfants au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 32

**Tableau 14E.** Nombre total de cas de sida par catégorie d'exposition et par groupe d'âge au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 33

**Tableau 15A.** Nombre de cas de sida déclarés par province/territoire et par sexe au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 34

**Tableau 15B.** Nombre de cas de sida déclarés par province/territoire et par année du diagnostic chez les hommes, tous âges confondus, au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 35

**Tableau 15C.** Nombre de cas de sida déclarés par province/territoire, par année du diagnostic, chez les femmes, tous âges confondus, au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 36

**Tableau 15D.** Nombre total de cas de sida déclarés par province/territoire et par année du diagnostic, tous âges confondus, au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 37

**Tableau 16.** Nombre de cas de sida et distribution en pourcentage, par catégorie d'exposition et par province/territoire, au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 38

**Tableau 17.** Nombre et distribution en pourcentage de tous les cas de sida diagnostiqués au 31 décembre 1998, par origine ethnique, au Canada; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 40

**Tableau 18.** Nombre de décès déclarés et total cumulatif, par année de décès, cas diagnostiqués au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999 41

**SECTION IV**
**Statistiques mondiales sur le sida** 42

**Annexe 1** Guide d'utilisation du système Faxlink 49

**Annexe 2** Sources des données 50

# Observations sur la surveillance des tests positifs pour le VIH et sur les diagnostics de sida

## Tests positifs pour le VIH

Le présent rapport a été réalisé par la Division de la surveillance du VIH/sida sur la foi de données confidentielles non nominatives sur les cas de séropositivité fournies par toutes les provinces et les territoires du Canada.

Les données contenues dans le présent rapport fournissent UNIQUEMENT de l'information sur les personnes qui ont subi un test de dépistage et ne rendent donc pas compte du nombre total de personnes infectées par le VIH au Canada. Les données indiquées relativement aux tests positifs pour le VIH peuvent changer en raison d'un phénomène artificiel lié aux profils de détection (qui demande à subir un test et quand), d'une élimination plus rigoureuse des enregistrements en double et/ou d'un retard de déclaration dans le cas des périodes les plus récentes.

Les tests réalisés plus d'une fois pour le même sujet séropositif, également appelés enregistrements en double, donnent lieu à une surestimation du nombre de tests séropositifs déclarés. Il est difficile d'éliminer les enregistrements en double étant donné que la déclaration des cas de VIH est non nominative (aucun nom est signalé) dans certaines provinces. Dans la mesure du possible, les provinces et les territoires revoient périodiquement les données concernant les cas de séropositivité révélés par les tests pour déceler les enregistrements en double et rendre compte le plus fidèlement possible du nombre de nouveaux cas de séropositivité observés.

De plus, au Québec, le nombre de cas de séropositivité déclarés est fondé sur le nombre minimal de sujets séropositifs. Le nombre de tests positifs déclarés est plus élevé au Québec, mais pour la majorité des autres cas signalés au Québec, les enregistrements en double n'ont pu être éliminés.

Les données contenues dans ce rapport concernent la période se terminant le 31 décembre 1998. Il faut cependant signaler que les données relatives aux tests séropositifs déclarés n'ont pas toutes été reçues par Santé Canada au dernier jour de cette période. Les tests déclarés au cours de la période de huit semaines suivant le dernier jour sont inclus dans le rapport.

Au cours de la période de 12 mois allant de janvier à décembre 1998, 2 301 tests positifs pour le VIH (les enregistrements en double étant éliminés dans la mesure du possible) ont été signalés au LLCM au 26 février 1999. En 1997, on dénombrait 2 558 cas déclarés de séropositivité pour le VIH, contre 2 783 en 1996 et 2 999 en 1995.

Comme l'élimination des enregistrements en double a varié pendant la période de 1985 à 1994, la comparaison des taux annuels n'est pas nécessairement valide. Nous avons toutefois comparé les proportions pour les périodes de 1985 à 1994, 1995 , 1996, 1997 et 1998. Ces comparaisons reposent sur l'hypothèse que le taux d'enregistrements en double ne diffère pas de façon significative selon la période pour une même variable.

### Proportion des tests positifs pour le VIH parmi les femmes

Les femmes représentent 12,5 % des cas de séropositivité à l'égard du VIH dont l'âge et le sexe sont connus. La proportion de tests positifs pour le VIH est à la hausse parmi les femmes. En 1998, 21,8 % des tests positifs (sur l'ensemble des tests positifs chez les adultes, pour lesquels le sexe était connu) étaient signalés chez des femmes. En 1997, cette proportion s'établissait à 21,6 %.

### Proportion des tests positifs pour le VIH parmi les hétérosexuels, les utilisateurs de drogues injectables et les hommes ayant des relations homosexuelles

La proportion de tests positifs pour le VIH associés aux relations hétérosexuelles est à la hausse. En 1998, cette catégorie d'exposition représentait 16,0 % des tests positifs (sur

l'ensemble des tests positifs pour lesquels la catégorie d'exposition et l'âge des sujets étaient connus). Ce chiffre s'établissait à 6,2 % pour les années 1985 à 1994.

La proportion de tests positifs pour le VIH augmente également parmi les utilisateurs de drogues injectables. Elle est en effet passée de 9,0 % (sur l'ensemble des cas de séropositivité chez les adultes, pour lesquels la catégorie d'exposition et l'âge des sujets étaient connus) pour les années 1985-1994 à 29,8 % en 1995 et à 33,5 % en 1997. En 1998, la proportion de tests positifs classés dans cette catégorie d'exposition était de 29,0 %. Il est trop tôt pour déterminer si cette relative baisse est artificielle ou réelle. Seule une surveillance continue permettra de mieux faire la lumière sur la question.

En revanche, les hommes qui ont des relations homosexuelles comptent pour une proportion de plus en plus faible des tests positifs pour le VIH, laquelle est passée de 75,0 % (de l'ensemble des tests positifs pour lesquels la catégorie d'exposition était indiquée) entre 1985 et 1994, à 44,3 % en 1995 et à 36,5 % en 1998.

Il faut considérer ces taux avec circonspection en raison du grand nombre de résultats pour lesquels la catégorie d'exposition ou le sexe n'ont pas été indiqués et des répercussions des changements dans les clientèles qui entreprennent de passer un test de détection.

## Incidence du sida

Un total cumulatif de 16 236 cas de sida avait été diagnostiqué au Canada au 31 décembre 1998 et déclaré au Bureau du VIH/sida, les MTS et de la tuberculose du LLCM au 26 février 1999. De ce nombre, 16 048 cas avaient été diagnostiqués chez des adultes, et 187 chez des enfants de < 15 ans (dans un cas, la catégorie d'âge n'était pas connue). On a signalé 11 534 décès attribuables au sida (71 % de tous les cas déclarés), ce qui constitue probablement une sous-estimation qui s'explique par les retards dans les déclarations et l'ampleur inconnue de la sous-déclaration.

### Proportion des cas de sida déclarés chez les femmes

Du début de l'épidémie jusqu'à la fin de la période de déclaration, 7,5 % de l'ensemble des cas de sida ont été déclarés chez des femmes. En 1998, la proportion de ces cas s'élevait à 13,6 %.

# Notes techniques Catégorie d expositio n

## Hiérarchie des catégories d exposition

Les cas d'infection à VIH et de sida sont classés dans une même catégorie d'exposition, selon une hiérarchie établie de modes d'exposition (facteurs de risque).

Lorsque plus d'un mode d'exposition est signalé, le cas est classé suivant la catégorie d'exposition qui figure en premier dans la liste établie. Par exemple, une personne qui utilise des drogues injectables peut également être à risque pour l'infection à VIH de par ses activités hétérosexuelles, mais l'utilisation de drogues injectables (UDI) est reconnue comme étant l'activité qui comporte un risque plus élevé. Ce genre de cas est donc classé dans la catégorie d'exposition UDI, même si la personne peut par ailleurs être active sexuellement. La seule exception est le cas des hommes qui, selon les données fournies, ont eu des relations homosexuelles (HRH) et ont fait usage de drogues injectables. Ces cas sont classés dans une catégorie d'exposition combinée, soit les «hommes qui ont des relations homosexuelles et qui utilisent des drogues injectables» (HRH/UDI).

## Critères applicables aux catégories

Les cas classés dans la catégorie «hommes qui ont des relations homosexuelles» (HRH) englobent les hommes qui déclarent soit des contacts homosexuels, soit des contacts bisexuels.

L'exposition au sang ou aux produits sanguins est maintenant décomposée en deux sous-catégories : receveur de sang et receveur de facteurs de coagulation. Avant 1998, il était impossible de déclarer les cas de séropositivité selon ces sous-catégories, mais les rapports de surveillance à venir continueront de rendre compte de ce changement.

Les cas classés «contacts hétérosexuels» sont répartis en deux sous-catégories :

(a) personnes nées dans un pays de profil II (autrement dit, un pays où les contacts hétérosexuels sont le mode de transmission prédominant), et

(b) personnes déclarant des contacts hétérosexuels avec une personne qui est soit infectée par le VIH, soit à risque accru d'infection à VIH (par exemple, un utilisateur de drogues injectables).

On trouvera des renseignements complets sur les cas d'exposition professionnelle chez les femmes dans le *RMTC* 1992;18:102-03.

Les cas pour lesquels les contacts hétérosexuels sont le seul facteur de risque déclaré et dont on ignore le mode d'exposition du partenaire hétérosexuel, sont classés dans la catégorie «aucun risque identifié – hétérosexuel» (ARI – hétérosexuel).

Les cas classés «aucun risque identifié» (ARI) sont les personnes dont on ne connaît pas les antécédents et qui, ayant été questionnées, ne déclarent aucune exposition au VIH par le biais de l'un ou l'autre des modes de transmission énumérés dans la hiérarchie. Cette catégorie peut inclure les cas qui font actuellement l'objet d'un suivi de la part des services de santé locaux, ceux dont les antécédents sont incomplets parce qu'ils sont décédés, ont refusé d'être interrogés ou ont échappé au suivi, et ceux qui sont incapables de déterminer un mode de transmission.

Dans certaines provinces, l'information concernant la catégorie d'exposition ne peut être déclarée. Les cas relevant de cette catégorie sont classés sous la rubrique «non déclaré».

**Remarque :** Le total des pourcentages indiqués dans les tableaux ne correspond pas nécessairement à 100, les chiffres ayant été arrondis.

# SECTION I

## Le VIH au Canada Tests positifs pour le VIH au Canad a

**Tableau 1.** Nombre de tests positifs pour le VIH au Canada, par année du test, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| Année du test | Cas signalés au LLCM |
|---|---|
| 1985-1994 | 32 706 |
| 1995 | 2 999 |
| 1996 | 2 783 |
| 1997 | 2 558 |
| 1998 | 2 301 |
| **Total** | **43 347** |

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998,* Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 2.** Nombre cumulatif de tests positifs pour le VIH signalés chez les adultes et les enfants du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998, par sexe, au Canada; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| Groupe d'âge<br>Sexe | Nombre de tests signalés | %[1] |
|---|---|---|
| **Enfants (< 15 ans)[2,3]** | **630** | **1,6** |
| Masculin | 330 | 59,9 |
| Féminin | 221 | 40,1 |
| Sexe non signalé[4] | 79 | |
| **Adultes (≥ 15 ans)[2]** | **38 144** | **98,4** |
| Masculin | 30 354 | 87,5 |
| Féminin | 4 319 | 12,5 |
| Sexe non signalé[4] | 3 471 | |
| **Groupe d'âge non signalé** | **4 573** | |
| Masculin | 2 146 | |
| Féminin | 183 | |
| Sexe non signalé[4] | 2 244 | |
| **Total** | **43 347** | **100,0** |

[1] Le pourcentage est fondé sur le nombre total moins les cas pour lesquels le sexe et le groupe d'âge étaient inconnus.

[2] Avant 1998, les groupes d'âge établis en Alberta différaient de ceux qui sont utilisés dans le présent rapport. Par conséquent, les données de cette province pour le groupe 0-9 ans ont été incluses dans le groupe des enfants et celles du groupe 10-19 ans ont été incluses dans la catégorie des adultes.

[3] Les données pour le Québec sont fondées uniquement sur les résultats [illegible] concernant les cas de > 2 ans.

[4] Avant 1998, les données sur le VIH pour l'Alberta et l'Île-du-Prince-Édouard n'ont pu être obtenues par groupe d'âge et par sexe. Elles sont donc classées dans la catégorie Sexe non signalé uniquement pour ce type de tableau.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 3A.** Nombre de tests positifs pour le VIH par groupe d'âge et année du test chez les hommes au Canada du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du test | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985-1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| **Groupe d'âge** | | | | | | n | %[1] |
| **Enfants** | | | | | | | |
| < 15 ans[2] | 218 | 27 | 33 | 25 | 27 | 330 | 1,1 |
| **Adultes** | 22 929 | 2 124 | 1 906 | 1 732 | 1 663 | 30 354 | 98,9 |
| 15 à 19 ans | 264 | 8 | 23 | 10 | 9 | 314 | 1,0 |
| 20 à 29 ans | 6 877 | 473 | 365 | 303 | 263 | 8 281 | 27,0 |
| 30 à 39 ans | 9 723 | 967 | 892 | 813 | 738 | 13 133 | 42,8 |
| 40 à 49 ans | 4 459 | 484 | 423 | 406 | 450 | 6 222 | 20,3 |
| 50 ans et + | 1 606 | 192 | 203 | 200 | 203 | 2 404 | 7,8 |
| **Groupe d'âge non signalé** | 2 000 | 45 | 39 | 26 | 36 | 2 146 | |
| **Total[3]** | **25 147** | **2 196** | **1 978** | **1 783** | **1 726** | **32 830** | **100,0** |

[1] Le pourcentage est fondé sur le nombre total moins les cas pour lesquels le groupe d'âge était inconnu ou non signalé.

[2] Les données pour le Québec sont fondées uniquement sur les résultats positifs concernant les cas de > 2 ans.

[3] Avant 1998, les données sur le VIH de l'Alberta et de l'Île-du-Prince-Édouard n'étaient pas accessibles selon le groupe d'âge et le sexe.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998,* Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 3B.** Nombre de tests positifs pour le VIH par groupe d'âge et année du test chez les femmes au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du test | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985-1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| **Groupe d'âge** | | | | | | n | % [1] |
| **Enfants** | | | | | | | |
| < 15 ans[2] | 103 | 29 | 42 | 22 | 25 | 221 | 4,9 |
| **Adultes** | 2 449 | 494 | 487 | 431 | 458 | 4 319 | 95,1 |
| 15 à 19 ans | 115 | 15 | 12 | 15 | 14 | 171 | 3,8 |
| 20 à 29 ans | 966 | 183 | 169 | 147 | 159 | 1 624 | 35,8 |
| 30 à 39 ans | 891 | 224 | 204 | 182 | 180 | 1 681 | 37,0 |
| 40 à 49 ans | 298 | 51 | 76 | 61 | 73 | 559 | 12,3 |
| 50 ans et + | 179 | 21 | 26 | 26 | 32 | 284 | 6,3 |
| **Groupe d âge non signalé** | 147 | 7 | 13 | 10 | 6 | 183 | |
| **Total[3]** | **2 699** | **530** | **542** | **463** | **489** | **4 723** | **100,0** |

[1] Le pourcentage est fondé sur le nombre total moins les cas pour lesquels le groupe d'âge était inconnu ou non signalé.

[2] Les données pour le Québec sont fondées uniquement sur les résultats positifs concernant les cas de > 2 ans.

[3] Avant 1998, les données sur le VIH de l'Alberta et de l'Île-du-Prince-Édouard n'étaient pas accessibles selon le groupe d'âge et le sexe.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 3C.** Nombre de tests positifs pour le VIH par groupe d'âge et année du test au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du test | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985 -1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| **Groupe d âge** | | | | | | n | %[1] |
| **Enfants** | | | | | | | |
| < 15 ans[2,3] | 357 | 71 | 87 | 62 | 53 | 630 | 1,6 |
| **Adultes** | 28 097 | 2 837 | 2 625 | 2 426 | 2 159 | 38 144 | 98,4 |
| 15 à 19 ans[2] | 437 | 28 | 40 | 35 | 23 | 563 | 1,5 |
| 20 à 29 ans | 8 740 | 712 | 593 | 505 | 428 | 10 978 | 28,3 |
| 30 à 39 ans | 11 687 | 1 290 | 1 195 | 1 097 | 937 | 16 206 | 41,8 |
| 40 à 49 ans | 5 256 | 573 | 550 | 532 | 532 | 7 443 | 19,2 |
| 50 ans et + | 1 977 | 234 | 247 | 257 | 239 | 2 954 | 7,6 |
| **Groupe d âge non signalé[4]** | 4 252 | 91 | 71 | 70 | 89 | 4 573 | |
| **Total** | **32 706** | **2 999** | **2 783** | **2 558** | **2 301** | **43 347** | **100,0** |

[1] Le pourcentage est fondé sur le nombre total moins les cas pour lesquels le groupe d'âge était inconnu ou non signalé.

[2] Avant 1998, les données sur le VIH de l'Alberta et de l'Île-du-Prince-Édouard n'étaient pas accessibles selon le groupe d'âge. Par conséquent, elles sont classées dans la catégorie Groupe d'âge non signalé uniquement pour ce type de tableau.

[3] Les données pour le Québec sont fondées uniquement sur les résultats positifs concernant les cas de > 2 ans.

[4] Avant 1998, les données sur le VIH de l'Île-du-Prince-Édouard n'étaient pas accessibles par groupe d'âge. Par conséquent, elles sont classées dans la catégorie groupe d'âge non signalé uniquement pour ce type de tableau.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998,* Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 4A.** Nombre de tests positifs pour le VIH par catégorie d'exposition et année du test chez les hommes adultes au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du test | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985-1994 | | 1995 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | Total | |
| **Catégorie d'exposition** | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | %[1] |
| HRH | 11 410 | 81,0 | 670 | 55,1 | 578 | 50,9 | 471 | 46,8 | 395 | 46,7 | 13 524 | 73,9 |
| HRH/UDI | 311 | 2,2 | 51 | 4,2 | 40 | 3,5 | 31 | 3,1 | 22 | 2,6 | 455 | 2,5 |
| UDI | 993 | 7,0 | 292 | 24,0 | 332 | 29,3 | 305 | 30,3 | 222 | 26,3 | 2 144 | 11,7 |
| Sang/produits sanguins[2] | 500 | 3,5 | 16 | 1,3 | 11 | 1,0 | 7 | 0,7 | | | 534 | 2,9 |
| a) receveur de sang | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 5 | 0,6 | 5 | 0,0 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 5 | 0,6 | 5 | 0,0 |
| Contacts hétérosexuels/ endémie[2] | 451 | 3,2 | 90 | 7,4 | 100 | 8,8 | 122 | 12,1 | | | 763 | 4,2 |
| a) originaire d un pays de profil II | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 15 | 1,8 | 15 | 0,1 |
| b) contacts sexuels avec une personne à risque | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 75 | 8,9 | 75 | 0,4 |
| ARI - hétérosexuel | 125 | 0,9 | 50 | 4,1 | 44 | 3,9 | 34 | 3,4 | 49 | 5,8 | 302 | 1,7 |
| Autre | 298 | 2,1 | 48 | 3,9 | 29 | 2,6 | 36 | 3,6 | 57 | 6,7 | 468 | 2,6 |
| ARI | 2 019 | | 86 | | 83 | | 86 | | 84 | | 2 358 | |
| Catégorie d exposition non signalée[3] | 9 474 | | 976 | | 832 | | 805 | | 734 | | 12 821 | |
| **Total[4,5]** | **25 581** | **100,0** | **2 279** | **100,0** | **2 049** | **100,0** | **1 897** | **100,0** | **1 663** | **100,0** | **33 469** | **100,0** |

[1] Le pourcentage est fondé sur le nombre total moins les cas pour lesquels la catégorie d'exposition était inconnue ou non signalée.

[2] Avant 1998, le sang/les produits sanguins et les contacts hétérosexuels/endémie étaient des catégories d'exposition combinées, mais ont été subdivisés dans la mesure du possible aux fins de la déclaration en 1998.

[3] Les données sur les catégories d'exposition des personnes dont les tests sont positifs ne sont pas accessibles pour le Québec.

[4] Les chiffres tiennent compte des hommes dont l'âge était inconnu.

[5] Avant 1998, les données sur le VIH de l'Alberta n'étaient pas accessibles par groupe d'âge et par sexe. Par conséquent, les données sur les enfants sont comprises dans les données sur les adultes, uniquement pour ce type de tableau.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 4B.** Nombre de tests positifs pour le VIH par catégorie d'exposition et année du test chez les femmes adultes au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du test | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985-1994 | | 1995 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | Total | |
| **Catégorie d'exposition** | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | %[1] |
| UDI | 370 | 32,6 | 159 | 53,9 | 159 | 52,0 | 125 | 45,1 | 92 | 39,0 | 905 | 40,2 |
| Sang/produits sanguins[2] | 137 | 12,1 | 11 | 3,7 | 3 | 1,0 | 4 | 1,4 | | | 155 | 6,9 |
| a) receveur de sang | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 8 | 3,4 | 8 | 0,4 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 3 | 1,3 | 3 | 0,1 |
| Contacts hétérosexuels/endémie[2] | 493 | 43,4 | 75 | 25,4 | 107 | 35,0 | 90 | 32,5 | | | 765 | 34,0 |
| a) originaire d un pays de profil II | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 17 | 7,2 | 17 | 0,8 |
| b) contacts sexuels avec une personne à risque | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 66 | 28,0 | 66 | 2,9 |
| ARI - hétérosexuel | 62 | 5,5 | 29 | 9,8 | 25 | 8,2 | 37 | 13,3 | 38 | 16,1 | 191 | 8,5 |
| Autre | 73 | 6,4 | 21 | 7,1 | 12 | 3,9 | 21 | 7,6 | 12 | 5,1 | 139 | 6,2 |
| ARI | 291 | | 29 | | 22 | | 16 | | 14 | | 372 | |
| Catégorie d exposition non signalée[3] | 1 285 | | 217 | | 212 | | 204 | | 208 | | 2 126 | |
| **Total**[4,5] | **2 711** | **100,0** | **541** | **100,0** | **540** | **100,0** | **497** | **100,0** | **458** | **100,0** | **4 747** | **100,0** |

[1] Le pourcentage est fondé sur le nombre total moins les cas pour lesquels la catégorie d'exposition était inconnue ou non signalée.

[2] Avant 1998, le sang/les produits sanguins et les contacts hétérosexuels/endémie étaient des catégories d'exposition combinées, mais ont été subdivisés dans la mesure du possible aux fins de la déclaration en 1998.

[3] Les données sur les catégories d'exposition des personnes dont les tests sont positifs ne sont pas accessibles pour le Québec.

[4] Les chiffres tiennent compte des femmes dont l'âge était inconnu.

[5] Avant 1998, les données sur le VIH de l'Alberta n'étaient pas accessibles par groupe d'âge et par sexe. Par conséquent, les données sur les enfants sont comprises dans les données sur les adultes, uniquement pour ce type de tableau.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 4C.** Nombre de tests positifs pour le VIH par catégorie d'exposition et année du test, chez les adultes au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du test | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985-1994[1] | | 1995 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | Total | |
| **Catégorie d'exposition** | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | %[2] |
| HRH | 11 523 | 74,7 | 671 | 44,1 | 578 | 39,9 | 474 | 36,6 | 397 | 36,4 | 13 643 | 65,7 |
| HRH/UDI | 313 | 2,0 | 53 | 3,5 | 40 | 2,8 | 32 | 2,5 | 22 | 2,0 | 460 | 2,2 |
| UDI | 1 400 | 9,1 | 456 | 29,9 | 497 | 34,3 | 436 | 33,6 | 318 | 29,2 | 3 107 | 15,0 |
| Sang/produits sanguins[3] | 657 | 4,3 | 27 | 1,8 | 16 | 1,1 | 13 | 1,0 | | | 713 | 3,4 |
| a) Receveur de sang | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 13 | 1,2 | 13 | 0,1 |
| b) Receveur de facteurs de coagulation | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 9 | 0,8 | 9 | 0,0 |
| Contacts hétérosexuels/endémie[3] | 963 | 6,2 | 168 | 11,0 | 207 | 14,3 | 215 | 16,6 | | | 1 553 | 7,5 |
| a) originaire d un pays de profil II | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 32 | 2,9 | 32 | 0,2 |
| b) contacts sexuels avec une personne à risque | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 143 | 13,1 | 143 | 0,7 |
| ARI - hétérosexuel | 187 | 1,2 | 79 | 5,2 | 69 | 4,8 | 71 | 5,5 | 87 | 8,0 | 493 | 2,4 |
| Autre | 378 | 2,5 | 69 | 4,5 | 41 | 2,8 | 55 | 4,2 | 69 | 6,3 | 612 | 2,9 |
| ARI[4] | 4 552 | | 162 | | 156 | | 152 | | 182 | | 5 204 | |
| Catégorie d exposition non signalée[5] | 12 405 | | 1 256 | | 1 100 | | 1 060 | | 976 | | 16 797 | |
| **Total[6,7]** | **32 378** | **100,0** | **2 941** | **100,0** | **2 704** | **100,0** | **2 508** | **100,0** | **2 248** | **100,0** | **42 779** | **100,0** |

[1] Pour la période de 1985-1994, le groupe des < 15 ans est combiné avec celui des adultes, pour le Manitoba.

[2] Le pourcentage est fondé sur le nombre total moins les cas pour lesquels la catégorie d'exposition était inconnue ou non signalée.

[3] Avant 1998, le sang/les produits sanguins et les contacts hétérosexuels/endémie faisaient partie de catégories d'exposition combinées, mais ont été désagrégés dans la mesure du possible aux fins de la déclaration en 1998.

[4] Les données sur le VIH de 1997 ne sont pas accessibles par catégorie d'exposition, pour l'Alberta. Par conséquent, elles sont classées dans la catégorie Aucun risque identifié, aux fins de la déclaration.

[5] Les données sur les catégories d'exposition des personnes dont les tests sont positifs ne sont pas accessibles pour le Québec.

[6] Les chiffres comprennent les cas dont l'âge et (ou) le sexe sont inconnus.

[7] Avant 1998, les données sur le VIH de l'Alberta n'étaient pas accessibles par groupe d'âge et par catégorie d'exposition. Par conséquent, les données sur les enfants sont comprises dans les données sur les adultes, uniquement pour ce type de tableau.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998,* Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 4D.** Nombre de tests positifs pour le VIH par catégorie d'exposition et année du test, chez les enfants au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du test | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985-1994[1] | | 1995 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | | |
| **Catégorie d'exposition** | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | %[2] |
| Sang/produits sanguins[3] | 79 | 40,7 | 1 | 3,0 | 1 | 2,3 | 1 | 5,9 | | | 82 | 26,4 |
| a) receveur de sang | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 1 | 4,2 | 1 | 0,3 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | s/o | | s/o | | s/o | | s/o | | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ARI - hétérosexuel | s/o | | 1 | | s/o | | s/o | | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| Transmission périnatale | 104 | 53,6 | 31 | 93,9 | 40 | 93,0 | 12 | 70,6 | 22 | 91,7 | 209 | 67,2 |
| Autre | 11 | 5,7 | 0 | 3,0 | 2 | 4,7 | 4 | 23,5 | 1 | 4,2 | 18 | 5,8 |
| ARI | 36 | | 2 | | 0 | | 10 | | 2 | | 50 | |
| Catégorie d exposition non signalée[4] | 98 | | 23 | | 36 | | 23 | | 27 | | 207 | |
| **Total[5,6]** | **328** | **100,0** | **58** | **100,0** | **79** | **100,0** | **50** | **100,0** | **53** | **100,0** | **568** | **100,0** |

[1] Pour la période de 1985-1994, le groupe des < 15 ans est combiné avec celui des adultes pour le Manitoba.

[2] Le pourcentage est fondé sur le nombre total moins les cas pour lesquels la catégorie d'exposition était inconnue ou non signalée.

[3] Avant 1998, le sang/les produits sanguins et les contacts hétérosexuels/endémie faisaient partie de catégories d'exposition combinées, mais ont été subdivisés dans la mesure du possible aux fins de la déclaration en 1998.

[4] Les données sur les catégories d'exposition des personnes dont les tests sont positifs ne sont pas accessibles pour le Québec.

[5] Les données pour le Québec sont fondées uniquement sur les résultats positifs concernant les cas de > 2 ans.

[6] Avant 1998, les données sur le VIH de l'Alberta n'étaient pas accessibles par groupe d'âge et par catégorie d'exposition. Par conséquent, les données sur les enfants sont comprises dans les données sur les adultes, uniquement pour ce type de tableau.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998,* Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 4E.** Nombre de tests positifs pour le VIH par catégorie d'exposition et par groupe d'âge au Canada, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| | Groupe d'âge | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Enfants | | | | | Adultes | | | | | | | |
| **Catégorie d'exposition** | < 1 an[1] | 1 - 4 ans[1] | 5 9 ans | 10 14 ans | **Total Enfants** | 15 - 19 ans | 20 - 29 ans | 30 - 39 ans | 40 - 49 ans | 50 ans et + | **Total Adultes** | **Groupe d'âge non signalé** | **Total** |
| HRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 | 175 | 100 | 43 | 397 | 14 | 411 |
| HRH/UDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 22 | 1 | 23 |
| UDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 148 | 80 | 19 | 317 | 4 | 321 |
| Sang/produits sanguins | | | | | | | | | | | | | |
| a) receveur de sang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | 0 | 14 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Contacts hétérosexuels/endémie | | | | | | | | | | | | | |
| a) originaire d'un pays de profil II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 4 | 3 | 34 | 1 | 35 |
| b) contacts sexuels avec une personne à risque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 46 | 31 | 19 | 141 | 1 | 142 |
| ARI - hétérosexuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 33 | 20 | 8 | 87 | 1 | 88 |
| Transmission périnatale | 20 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Autre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 27 | 11 | 15 | 68 | 1 | 70 |
| ARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 41 | 31 | 11 | 101 | 4 | 107 |
| Catégorie d'exposition non signalée[2] | 14 | 7 | 5 | 1 | 27 | 7 | 167 | 433 | 244 | 119 | 970 | 60 | 1 057 |
| **Total** | **34** | **10** | **8** | **1** | **53** | **23** | **428** | **937** | **532** | **239** | **2 159** | **89** | **2 301** |

[1] Les données pour le Québec sont fondées uniquement sur les résultats positifs concernant les cas de > 2 ans.

[2] Les données sur les catégories d'exposition des personnes dont les tests sont positifs ne sont pas accessibles pour le Québec.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998,* Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 5A.** Nombre cumulatif de tests positifs pour le VIH par province/territoire et par sexe au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| | Nombre de tests positifs pour le VIH | | Ratio[1] |
|---|---|---|---|
| **Province/Territoire** | Hommes | Femmes | Hommes : femmes |
| C.-B. | 7 981 | 1 076 | 7:1 |
| Yukon | 18 | 6 | 3:1 |
| Alberta | 2 686 | 394 | 7:1 |
| T.N.-O. | 26 | 6 | 4:1 |
| Sask. | 217 | 64 | 3:1 |
| Man. | 614 | 95 | 6:1 |
| Ont. | 16 583 | 1 944 | 9:1 |
| Qc[2] | 6 507 | 1 363 | 5:1 |
| N.-B. | 205 | 26 | 8:1 |
| Î.-P.-É. et N.-É. | 468 | 66 | 7:1 |
| T.-N. | 144 | 40 | 4:1 |
| **Total[3]** | **35 449** | **5 080** | **7:1** |

[1] Le ratio est fondé sur les cas où le sexe est signalé.

[2] Les données concernant le Québec sont fondées sur le nombre minimal de personnes dont les tests étaient positifs, les enregistrements en double étant éliminés. Le nombre de tests positifs déclaré est plus élevé dans cette province, mais pour la plupart des autres cas signalés au Québec, les enregistrements en double n'ont pu être éliminés.

[3] Les totaux diffèrent de ceux présentés dans d'autres types de tableaux étant donné l'accessibilité de données sur les cas de séropositivité déclarés selon le sexe.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998,* Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 5B.** Nombre de tests positifs pour le VIH par province/territoire et année du test au Canada, du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du test | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985-1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| **Province/Territoire** | | | | | | n | % |
| C.-B.[1] | 6 974 | 690 | 714 | 568 | 480 | 9 426 | 21,7 |
| Yukon | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | 0,1 |
| Alberta | 2 402 | 179 | 178 | 217 | 104 | 3 080 | 7,1 |
| T.N.-O. | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 | 0,1 |
| Sask. | 280 | 28 | 24 | 42 | 24 | 398 | 0,9 |
| Man. | 468 | 51 | 55 | 74 | 61 | 709 | 1,6 |
| Ont. | 15 034 | 1 367 | 1 081 | 976 | 1 001 | 19 459 | 44,9 |
| Qc[2] | 6 735 | 623 | 669 | 630 | 584 | 9 241 | 21,3 |
| N.-B. | 189 | 11 | 12 | 6 | 13 | 231 | 0,5 |
| Î.-P.-É. et N.-É. | 425 | 42 | 34 | 35 | 27 | 563 | 1,3 |
| T.-N. | 157 | 7 | 10 | 7 | 3 | 184 | 0,4 |
| **Total** | **32 706** | **2 999** | **2 783** | **2 558** | **2 301** | **43 347** | **100,0** |

[1] Les résultats de la Colombie-Britannique antérieurs à 1995 différeront de ceux publiés auparavant parce que cette province a mis en place un processus automatisé d'élimination des enregistrements en double identifiables contenus dans les données. Après 1995, ce processus a été raffiné par le rappel des médecins; par conséquent, les données actuelles rendent davantage compte du nombre de nouveaux tests positifs que du nombre de tests réalisés en laboratoire. Aussi, les baisses apparentes entre 1994 et 1995 sont le résultat d'un artefact.

[2] Les données concernant le Québec sont fondées sur le nombre minimal de personnes dont les tests étaient positifs, les enregistrements en double étant éliminés. Le nombre de tests positifs déclaré est plus élevé dans cette province, mais pour la plupart des autres cas signalés au Québec, les enregistrements en double n'ont pu être éliminés.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 6.** Nombre de tests positifs pour le VIH par catégorie d'exposition et par province/territoire au Canada, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| Catégorie d'exposition | C.-B. | Yukon | Alberta | T.N.-O. | Sask. | Man. | Ont. | Qc[1] | N.-B. | Î.-P.-É. et N.-É. | T.-N. | Total n | Total %[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRH | 117 | 3 | 19 | 0 | 4 | 12 | 237 | s/o | 6 | 12 | 1 | 411 | 36,1 |
| HRH/UDI | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | s/o | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,0 |
| UDI | 185 | 0 | 43 | 0 | 10 | 22 | 54 | s/o | 2 | 5 | 0 | 321 | 28,2 |
| Sang/produits sanguins | | | | | | | | | | | | | |
| a) receveur de sang | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | s/o | 1 | 0 | 0 | 14 | 1,2 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | s/o | 1 | 0 | 0 | 9 | 0,8 |
| Contacts hétérosexuels/endémie | | | | | | | | | | | | | |
| a) originaire d un pays de profil II | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 19 | s/o | 0 | 3 | 0 | 33 | 2,9 |
| b) contacts sexuels avec une personne à risque | 89 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 17 | s/o | 2 | 6 | 1 | 144 | 12,7 |
| ARI - hétérosexuel | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71 | s/o | 0 | 0 | 1 | 88 | 7,7 |
| Transmission périnatale | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | s/o | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,1 |
| Autre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | s/o | 1 | 0 | 0 | 70 | 6,2 |
| ARI | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | s/o | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| Catégorie d exposition non signalée[3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 471 | 584 | 0 | 1 | 0 | 1 057 | |
| **Total** | **480** | **3** | **104** | **1** | **24** | **61** | **1 001** | **584** | **13** | **27** | **3** | **2 301** | **100,0** |

[1] Les données concernant le Québec sont fondées sur le nombre minimal de personnes dont les tests étaient positifs, les enregistrements en double étant éliminés. Le nombre de tests positifs déclaré est plus élevé dans cette province, mais pour la plupart des autres cas signalés au Québec, les enregistrements en double n'ont pu être éliminés.

[2] Le pourcentage est fondé sur le nombre total moins les cas pour lesquels la catégorie d'exposition était inconnue.

[3] Au Québec, l'information sur les catégories d'exposition des personnes dont les tests étaient positifs n'est pas disponible.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

# SECTION II

## Rapport du Programme de surveillance périnatale du VIH au Canada

Cette section du document contient des données nationales sur les nourrissons ayant été exposés au VIH pendant la période périnatale, données fournies par le Programme de surveillance périnatale du VIH au Canada, qui relève du Groupe canadien de recherche sur le sida chez les enfants*. Le Réseau canadien d'essai sur le VIH et la Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, ont facilité la création de la base de données canadienne sur le VIH chez les nourrissons. Les données sur le VIH chez les nourrissons présentées ici concernent la période de 1984 à 1998.

Les données proviennent d'une enquête nationale confidentielle et non nominative, réalisée par des centres pédiatriques de soins tertiaires des quatre coins du Canada. Les tableaux 7-9 rendent compte des données applicables aux nourrissons exposés au VIH, notamment a) les sujets dont l'état immunitaire à l'égard du VIH était indéterminé au moment de la déclaration et b) les cas confirmés d'infection par le VIH. Dans le cas des nourrissons dont l'état est indéterminé, un suivi indiquera leur état réel, autrement dit si leurs tests étaient positifs parce qu'ils étaient porteurs des anticorps anti-VIH de la mère et n'ont jamais été infectés par le VIH, ou s'ils sont réellement infectés par le VIH.

Les données périnatales présentées ici concernent des bébés nés de mères séropositives. Les chiffres ne rendent pas compte de tous les bébés qui correspondent à ce profil, étant donné que les femmes enceintes ne savent pas toutes si elles sont séropositives ou non. Un calcul du taux de transmission verticale qui reposerait sur ces données ne serait pas valide.

Le nombre de cas de séropositivité à l'égard du VIH chez les nourrissons signalé par le Programme de surveillance périnatale du VIH au Canada pourrait être plus élevé que le nombre déjà indiqué dans ce rapport dans le cas du groupe des <15 ans. Cet écart tient au recours à des sources de données différentes. Les données périnatales proviennent de sources cliniques (un processus de surveillance plus actif) alors que les données présentées antérieurement dans ce rapport sont fondées sur une combinaison de résultats positifs et de déclarations de médecins.

Le total peut varier légèrement dans le cas des tableaux 7-9. Les données relatives à certaines rubriques pourraient être manquantes. Par conséquent, en procédant à une analyse des données par tabulation recoupée, on a obtenu des totaux légèrement différents, ce qui n'a toutefois aucune incidence sur l'interprétation générale des résultats.

---

* Travail réalisé par le Groupe canadien de recherche sur le sida chez les enfants, qui compte parmi ses membres les D[re] R Bortolussi, F Boucher, R Bousquet, S Buchman, S Cassol, N Chatel, J Cohen, B Conway, R Cooper, D Davies, N Dayneka, J Embree, J Forbes, J Gill, J Gilmour, N Haley, T Jadavji, S Khorasheh, S King, N Lapointe, N Le Saux, N MacDonald, D Moore, H Onyett, D Patrick, V Pelletier, S Ratnam, S Read, L Samson, R Sandre, J Singer, F Smaill, M Storr, J Sutherland, B Tan, A Thorne, W Vaudry, G Wells, P Yan et D Zarowny.

**Tableau 7.** Nombre cumulatif de nourrissons exposés au VIH pendant la période périnatale au Canada, par région géographique et état sérologique actuel, 1984-1998

| | État actuel en décembre 1998 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Exposition indéterminée[1] | Infection confirmée asymptomatique | Infection confirmée symptomatique[2] | Séroconversion | Décès dû au sida | Décès / autres | Inconnu | Total n | Total % |
| Colombie-Britannique | 3 | 1 | 32 | 102 | 6 | 2 | 0 | 146 | 15,8 |
| Alberta | 7 | 0 | 10 | 18 | 1 | 1 | 0 | 37 | 4,0 |
| Prairie/Territoires[3] | 12 | 0 | 13 | 48 | 4 | 0 | 0 | 114 | 8,3 |
| Ontario | 23 | 18 | 51 | 138 | 33 | 5 | 3 | 271 | 29,3 |
| Québec | 17 | 26 | 63 | 198 | 59 | 9 | 1 | 373 | 40,4 |
| Provinces de l'Atlantique[4] | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2,2 |
| **Total** | **65** | **45** | **173** | **513** | **107** | **17** | **4** | **924** | **100,0** |
| % | 7,0 | 4,9 | 18,7 | 55,5 | 11,6 | 1,8 | 0,4 | 100,0 | |

[1] La séropositivité de la mère était confirmée mais l'état immunologique du nourrisson à l'égard du VIH était indéterminé au moment de la déclaration.

[2] Comprend les cas légers, moyens et sévères réunis.

[3] Comprend la Saskatchewan, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest.

[4] Comprend Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 8.** Nombre de nourrissons exposés au VIH pendant la période périnatale au Canada, par année de naissance et état sérologique actuel, 1984-1998

| État actuel | Année de naissance | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | < 1988 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| **Aucun traitement reçu** | 84 | 33 | 36 | 48 | 49 | 55 | 68 | 62 | 46 | 43 | 23 | 16 |
| Exposition indéterminée[1] | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Infection confirmée - asymptomatique | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Infection confirmée - symptomatique[2] | 20 | 7 | 11 | 16 | 13 | 16 | 17 | 18 | 14 | 20 | 9 | 3 |
| Séroconversion | 18 | 14 | 17 | 23 | 25 | 23 | 38 | 30 | 22 | 14 | 9 | 7 |
| Décès dûs au sida | 39 | 10 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Décès/autres | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Traitement reçu** | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 10 | 36 | 52 | 60 | 59 | 80 |
| Exposition indéterminée[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 29 |
| Infection confirmée - asymptomatique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Infection confirmée - symptomatique[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Séroconversion | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 31 | 47 | 54 | 43 | 46 |
| Décès dûs au sida | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès/autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| **Total[3]** | **84** | **33** | **36** | **50** | **53** | **71** | **78** | **98** | **98** | **103** | **82** | **96** |

[1] La séropositivité de la mère était confirmée mais l'état immunologique du nourrisson à l'égard du VIH était indéterminé au moment de la déclaration.

[2] Comprend les cas légers, moyens et sévères réunis.

[3] On n'a pu obtenir de données pour le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, ni le Yukon.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 9.** Nombre de nourrissons exposés au VIH pendant la période périnatale au Canada par année de naissance et catégorie d'exposition de la mère, 1984-1998

| | Catégorie d'exposition de la mère | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année de naissance | Receveuse de produits sanguins | Receveuse de transfusions sanguines | Relations sexuelles | UDI[1] | Endémie | Autre | Inconnu | Total n |
| <1988 | 0 | 10 | 34 | 4 | 39 | 0 | 3 | 90 |
| 1988 | 0 | 1 | 17 | 10 | 10 | 1 | 0 | 39 |
| 1989 | 0 | 4 | 18 | 7 | 10 | 0 | 1 | 40 |
| 1990 | 0 | 2 | 30 | 10 | 7 | 0 | 4 | 53 |
| 1991 | 0 | 2 | 32 | 13 | 11 | 0 | 1 | 59 |
| 1992 | 0 | 0 | 32 | 17 | 21 | 0 | 5 | 75 |
| 1993 | 1 | 0 | 28 | 26 | 20 | 0 | 7 | 82 |
| 1994 | 0 | 1 | 54 | 32 | 13 | 0 | 7 | 107 |
| 1995 | 0 | 0 | 48 | 41 | 16 | 0 | 2 | 107 |
| 1996 | 1 | 1 | 43 | 36 | 21 | 0 | 3 | 105 |
| 1997 | 0 | 0 | 36 | 30 | 20 | 0 | 1 | 87 |
| 1998 | 0 | 0 | 38 | 27 | 21 | | 7 | 93 |
| **Total[2]** | **2** | **21** | **410** | **253** | **209** | **1** | **41** | **937** |
| % | 0,2 | 2,2 | 43,8 | 27,0 | 22,3 | 0,1 | 4,4 | 100,0 |

[1] Utilisation de drogues injectables

[2] On n'a pu obtenir de données pour le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, ni le Yukon.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

# SECTION III

# Le sida au Canada Surveillance du sida jusqu au 31 décembre 199 8

Cette section du document *Le VIH et le sida au Canada* remplace l'ancienne publication trimestrielle intitulée *Le sida au Canada*, et couvre la période allant du début de l'épidémie au 31 décembre 1998.

## Période de déclaration

Dans ce rapport, tous les cas de sida ont été diagnostiqués avant le 31 décembre 1998 au plus tard. Il est à noter que tous les cas déclarés ne sont pas reçus par Santé Canada au dernier jour de la période de référence. Nous accordons officiellement aux provinces et aux territoires une période de 8 semaines après la fin de la période pour envoyer leurs rapports au LLCM. Nous acceptons toutefois les rapports des provinces et des territoires jusqu'au moment de clore le dossier pour la rédaction du Rapport de surveillance, publié 12 semaines après la fin de la période. Tous les cas reçus par la suite figurent dans le rapport suivant. Par conséquent, les titres des tableaux indiquent que tous les cas de sida inclus ont été diagnostiqués le ou avant le 31 décembre 1998, et que les informations à leur sujet ont été reçues par Santé Canada au 26 février 1999.

## Terminologie

**Total cumulatif des cas de sida** – Nombre total de cas de sida survenus dans la population, y compris ceux dont le décès n'a pas été signalé, depuis le tout début de l'épidémie. Ce chiffre ne se trouve pas directement dans le Système national de surveillance pour la déclaration des cas de sida à cause des retards de déclaration et de la sous-déclaration.

**Total cumulatif des cas de sida déclarés** – Nombre total de cas de sida survenus dans la population, y compris ceux qui sont décédés, depuis le tout début de l'épidémie, tel qu'on le trouve dans le Système national de surveillance pour la déclaration des cas de sida pour une date de référence. Dans le présent rapport, la date de référence est le 31 décembre 1998 et le total cumulatif des cas de sida déclarés au Canada s'élève à 16 236. Le total cumulatif des cas de sida déclarés ne représente qu'une portion du total cumulatif de cas de sida.

**Définition du sida aux fins de la surveillance au Canada** – Cette définition sert de critère normalisé pour l'inclusion ou l'exclusion des rapports de cas dans la base de données de surveillance du sida. Le cas de sida est défini par un résultat positif au test de dépistage du VIH et par le début d'une ou de plusieurs maladies cliniques précises, caractéristiques d'un système immunitaire affaibli. On trouvera plus d'information à ce sujet dans le RMTC 1993;19:116-17.

**Année/mois/jour du diagnostic de sida** – Année, mois et jour de la première manifestation des maladies cliniques énumérées dans la définition du sida aux fins de la surveillance au Canada, selon la déclaration du médecin pour un patient infecté par le VIH. Si plusieurs maladies ont été diagnostiquées à des époques différentes, l'année, le mois et le jour de la première d'entre elles servent de date du diagnostic de sida dans la base de données de surveillance du sida au Laboratoire de lutte contre la maladie (LLCM).

**Année/mois/jour de déclaration du cas de sida** – Année, mois et jour où un cas de sida diagnostiqué est entré dans la base de données informatisée de surveillance du sida.

**Retard de déclaration des cas de sida** – Délai entre le moment où est posé le diagnostic de sida et celui où le cas est déclaré. Pour 50 % du total cumulatif des cas de sida déclarés pour lesquels un retard de déclaration est mesuré, ce retard est inférieur à 9 mois; le plus long retard déclaré est de 13 ans.

**Total des cas de sida non déclarés** – Nombre total de cas de sida diagnostiqués, mais non encore déclarés. Certains de ces cas seront déclarés plus tard (retard de déclaration), mais certains pourraient ne jamais l'être.

**Total annuel des cas de sida déclarés par année de diagnostic** – Répartition du total cumulatif de cas de sida déclarés par année de diagnostic. À cause des retards de déclaration, la proportion de cas non déclarés par rapport au total annuel de cas déclarés par année de diagnostic est beaucoup plus élevée pour les années les plus récentes que pour les années plus lointaines.

**Total annuel des cas de sida déclarés par année de déclaration** – Répartition du total cumulatif de cas de sida déclarés par année de déclaration. S'il n'y avait aucun retard de déclaration, ce total concorderait avec le total annuel de cas de sida déclarés par année de diagnostic. Plus la différence entre ces chiffres et le total annuel de cas déclarés par année de diagnostic est prononcée, plus le problème des retards de déclaration risque d'être grave.

**Total annuel des cas de sida par année de diagnostic ajusté en fonction du retard de déclaration** – Les mesures du retard de déclaration du nombre cumulatif de cas de sida sont soumises à l'analyse statistique, ce qui permet d'obtenir le nombre estimatif de cas diagnostiqués chaque année qui finiront par être déclarés. Grâce à cette méthode, on peut, dans une large mesure, évaluer le nombre de cas non déclarés, ce qui est important pour l'interprétation des tendances. La méthode ne permet cependant pas d'évaluer les cas diagnostiqués, mais qui ne seront jamais déclarés.

Le rajustement des données en fonction du retard de déclaration fait couramment partie des rapports nationaux de surveillance du VIH et du sida. Cette caractéristique ne se retrouve pas dans le présent compte rendu, mais sera réintégrée aux rapports à venir.

**Tableau 10.** Nombre de cas de sida déclarés, par année de diagnostic jusqu'au 31 décembre 1998, Canada; dernières données signalées au LLCM au 26 février 1999

| Année du diagnostic de sida | Nombre signalé au LLCM |
|---|---|
| 1979 | 1 |
| 1980 | 5 |
| 1981 | 9 |
| 1982 | 25 |
| 1983 | 69 |
| 1984 | 165 |
| 1985 | 374 |
| 1986 | 636 |
| 1987 | 954 |
| 1988 | 1 159 |
| 1989 | 1 386 |
| 1990 | 1 423 |
| 1991 | 1 544 |
| 1992 | 1 709 |
| 1993 | 1 751 |
| 1994 | 1 698 |
| 1995 | 1 551 |
| 1996 | 1 000 |
| 1997 | 498 |
| 1998 | 279 |
| **Total** | **16 236** |

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 11.** Nombre de cas de sida déclarés et total cumulatif par année de diagnostic et par sexe chez les adultes au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Hommes | | Femmes | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année du diagnostic | Nbre de cas déclarés | Total cumulatif | Nbre de cas déclarés | Total cumulatif | Nbre de cas déclarés | Total cumulatif |
| < 1989 | 3 158 | 3 158 | 190 | 190 | 3 348 | 3 348 |
| 1989 | 1 295 | 4 453 | 79 | 269 | 1 374 | 4 722 |
| 1990 | 1 347 | 5 800 | 65 | 334 | 1 412 | 6 134 |
| 1991 | 1 434 | 7 234 | 97 | 431 | 1 531 | 7 665 |
| 1992 | 1 582 | 8 816 | 109 | 540 | 1 691 | 9 356 |
| 1993 | 1 621 | 10 437 | 116 | 656 | 1 737 | 11 093 |
| 1994 | 1 552 | 11 989 | 128 | 784 | 1 680 | 12 773 |
| 1995 | 1 399 | 13 388 | 126 | 910 | 1 525 | 14 298 |
| 1996 | 871 | 14 259 | 113 | 1 023 | 984 | 15 282 |
| 1997 | 418 | 14 677 | 70 | 1 093 | 488 | 15 770 |
| 1998 | 240 | 14 917 | 37 | 1 130 | 277 | 16 047 |
| **Total** [1] | **14 917** | | **1 130** | | **16 047** | |

[1] Dans deux cas, le sexe et (ou) le groupe d'âge n'étaient pas indiqués.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 12.** Nombre de cas de sida déclarés chez les enfants et les adultes, par groupe d'âge et par sexe au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| Groupe d'âge<br>Sexe | Nombre de cas déclarés | % du total |
|---|---|---|
| **Enfants** | **187** | **1,2** |
| Masculin | 99 | 0,6 |
| Féminin | 88 | 0,5 |
| **Adultes** | **16 047** | **98,8** |
| Masculin | 14 917 | 91,9 |
| Féminin | 1 130 | 7,0 |
| Tous les hommes | 15 016 | 92,5 |
| Toutes les femmes | 1 218 | 7,5 |
| **Total** [1] | **16 234** | **100,0** |

[1] Dans deux cas, le sexe et (ou) le groupe d'âge n'étaient pas indiqués.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 13A.** Nombre de cas de sida déclarés par groupe d'âge et par année de diagnostic chez les hommes au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du diagnostic | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | < 1989 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| **Groupe d'âge** | | | | | | | | | | | | n | % |
| **Enfants** | 24 | 8 | 6 | 7 | 13 | 4 | 8 | 14 | 9 | 5 | 1 | 99 | 0,7 |
| < 1 an | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 41 | 0,3 |
| 1 à 4 ans | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0,2 |
| 5 à 9 ans | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0,1 |
| 10 à 14 ans | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0,1 |
| **Adultes** | 3 158 | 1 295 | 1 347 | 1 434 | 1 581 | 1 621 | 1 553 | 1 399 | 871 | 418 | 240 | 14 917 | 99,3 |
| 15 à 19 ans | 18 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 46 | 0,3 |
| 20 à 29 ans | 652 | 259 | 255 | 248 | 252 | 233 | 189 | 156 | 91 | 30 | 20 | 2 385 | 15,9 |
| 30 à 39 ans | 1 388 | 564 | 597 | 617 | 726 | 714 | 748 | 640 | 395 | 193 | 97 | 6 679 | 44,5 |
| 40 à 49 ans | 774 | 345 | 364 | 410 | 445 | 492 | 445 | 408 | 252 | 125 | 92 | 4 152 | 27,7 |
| 50 ans et + | 326 | 125 | 126 | 156 | 155 | 176 | 167 | 193 | 131 | 69 | 31 | 1 655 | 11,0 |
| **Total [1]** | **3 182** | **1 303** | **1 353** | **1 441** | **1 595** | **1 625** | **1 560** | **1 413** | **880** | **423** | **241** | **15 016** | **100,0** |

[1] Dans deux cas, le sexe et (ou) le groupe d'âge n'étaient pas indiqués.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 13B.** Nombre de cas de sida déclarés par groupe d'âge et par année de diagnostic chez les femmes au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du diagnostic | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | < 1989 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| **Groupe d'âge** | | | | | | | | | | | | n | % |
| **Enfants** | 25 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 | 6 | 5 | 1 | 88 | 7,2 |
| < 1 an | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43 | 3,5 |
| 1 à 4 ans | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2,7 |
| 5 à 9 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0,7 |
| 10 à 14 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3 |
| **Adultes** | 190 | 79 | 65 | 97 | 109 | 116 | 128 | 126 | 113 | 70 | 37 | 1 130 | 92,8 |
| 15 à 19 ans | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0,8 |
| 20 à 29 ans | 65 | 25 | 20 | 31 | 36 | 26 | 38 | 30 | 24 | 19 | 5 | 319 | 26,2 |
| 30 à 39 ans | 55 | 28 | 26 | 34 | 44 | 56 | 42 | 60 | 52 | 27 | 18 | 442 | 36,3 |
| 40 à 49 ans | 23 | 12 | 6 | 19 | 19 | 17 | 26 | 25 | 28 | 14 | 9 | 198 | 16,3 |
| 50 ans et + | 46 | 13 | 12 | 11 | 10 | 17 | 22 | 10 | 7 | 9 | 4 | 161 | 13,2 |
| **Total [1]** | **215** | **83** | **70** | **103** | **114** | **126** | **138** | **137** | **119** | **75** | **38** | **1 218** | **100,0** |

[1] Dans deux cas, le sexe et (ou) le groupe d'âge n'étaient pas indiqués.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 13C.** Nombre de cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998 et répartition en pourcentage, par groupe d'âge et année du diagnostic au Canada, dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du diagnostic | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | < 1989 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| **Groupe d'âge** | | | | | | | | | | | | n | % |
| **Enfants** | 49 | 12 | 11 | 13 | 18 | 14 | 18 | 25 | 15 | 10 | 2 | 187 | 1,2 |
| < 1 an | 26 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 0 | 84 | 0,5 |
| 1 à 4 ans | 15 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 59 | 0,4 |
| 5 à 9 ans | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0,1 |
| 10 à 14 ans | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0,1 |
| **Adultes** | 3 348 | 1 374 | 1 412 | 1 531 | 1 690 | 1 737 | 1 681 | 1 526 | 984 | 488 | 277 | 16 048 | 98,8 |
| 15 à 19 ans | 19 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 56 | 0,3 |
| 20 à 29 ans | 717 | 284 | 275 | 279 | 288 | 259 | 227 | 186 | 115 | 49 | 25 | 2 704 | 16,7 |
| 30 à 39 ans | 1 443 | 592 | 623 | 651 | 770 | 770 | 790 | 701 | 447 | 220 | 115 | 7 122 | 43,9 |
| 40 à 49 ans | 797 | 357 | 370 | 429 | 464 | 509 | 471 | 433 | 280 | 139 | 101 | 4 350 | 26,8 |
| 50 ans et + | 372 | 138 | 138 | 167 | 165 | 193 | 189 | 203 | 138 | 78 | 35 | 1 816 | 11,2 |
| **Total** [1] | **3 397** | **1 386** | **1 423** | **1 544** | **1 709** | **1 751** | **1 698** | **1 551** | **999** | **498** | **279** | **16 235** | **100,0** |

[1] Dans un cas, le groupe d'âge n'était pas signalé.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998,* Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 14A.** Nombre de cas de sida et distribution en pourcentage par catégorie d'exposition et par année de diagnostic chez les adultes de sexe masculin au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du diagnostic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | < 1989 | | 1989 | | 1990 | | 1991 | | 1992 | | 1993 | | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | | |
| **Catégorie d'exposition** | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | %[1] |
| HRH | 2 644 | 85,8 | 1 063 | 84,7 | 1 067 | 82,8 | 1 126 | 82,5 | 1 235 | 81,6 | 1 235 | 79,0 | 1171 | 77,5 | 1021 | 75,9 | 576 | 67,8 | 259 | 64,1 | 135 | 57,9 | 11 532 | 80,0 |
| HRH/UDI | 111 | 3,6 | 52 | 4,1 | 62 | 4,8 | 66 | 4,8 | 77 | 5,1 | 88 | 5,6 | 99 | 6,6 | 76 | 5,7 | 53 | 6,2 | 19 | 4,7 | 10 | 4,3 | 713 | 4,9 |
| UDI | 26 | 0,8 | 25 | 2,0 | 28 | 2,2 | 47 | 3,4 | 55 | 3,6 | 71 | 4,5 | 89 | 5,9 | 93 | 6,9 | 90 | 10,6 | 44 | 10,9 | 29 | 12,4 | 597 | 4,1 |
| Sang/produits sanguins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) receveur de sang | 66 | 2,1 | 13 | 1,0 | 12 | 0,9 | 12 | 0,9 | 14 | 0,9 | 10 | 0,6 | 7 | 0,5 | 6 | 0,4 | 9 | 1,1 | 2 | 0,5 | 2 | 0,9 | 153 | 1,1 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | 60 | 1,9 | 29 | 2,3 | 32 | 2,5 | 30 | 2,2 | 28 | 1,8 | 16 | 1,0 | 21 | 1,4 | 22 | 1,6 | 14 | 1,6 | 6 | 1,5 | 3 | 1,3 | 261 | 1,8 |
| Contacts hétérosexuels/ endémie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) originaire d un pays de profil II | 121 | 3,9 | 36 | 2,9 | 38 | 3,0 | 36 | 2,6 | 45 | 3,0 | 61 | 3,9 | 43 | 2,8 | 43 | 3,2 | 48 | 5,6 | 30 | 7,4 | 15 | 6,4 | 516 | 3,6 |
| b) contacts sexuels avec une personne à risque | 46 | 1,5 | 30 | 2,4 | 32 | 2,5 | 35 | 2,6 | 52 | 3,4 | 66 | 4,2 | 70 | 4,7 | 77 | 5,7 | 51 | 6,0 | 32 | 7,9 | 25 | 10,7 | 516 | 3,6 |
| Exposition professionnelle | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| ARI - hétérosexuel | 9 | 0,3 | 7 | 0,6 | 17 | 1,3 | 13 | 1,0 | 9 | 0,6 | 16 | 1,0 | 9 | 0,6 | 7 | 0,5 | 9 | 1,1 | 11 | 2,7 | 14 | 6,0 | 121 | 0,8 |
| ARI | 75 | | 40 | | 59 | | 69 | | 67 | | 57 | | 43 | | 54 | | 21 | | 14 | | 7 | | 506 | |
| **Total[2]** | **3 158** | **100,0** | **1 295** | **100,0** | **1 347** | **100,0** | **1 434** | **100,0** | **1 582** | **100,0** | **1 621** | **100,0** | **1 552** | **100,0** | **1 399** | **100,0** | **871** | **100,0** | **418** | **100,0** | **240** | **100,0** | **14 917** | **100,0** |

[1] Les pourcentages sont fondés sur le nombre total moins les cas pour lesquels la catégorie d'exposition était inconnue (ARI).

[2] Dans deux cas, le sexe et (ou) le groupe d'âge n'étaient pas indiqués.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998,* Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 14B.** Nombre de cas de sida et distribution en pourcentage par catégorie d'exposition et par année de diagnostic chez les adultes de sexe féminin au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du diagnostic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | < 1989 | | 1989 | | 1990 | | 1991 | | 1992 | | 1993 | | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | | |
| **Catégorie d'exposition** | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | %[1] |
| UDI | 11 | 6,0 | 8 | 10,5 | 8 | 13,6 | 18 | 19,4 | 19 | 18,8 | 27 | 24,5 | 33 | 26,4 | 33 | 26,6 | 29 | 26,9 | 22 | 32,4 | 14 | 38,9 | 222 | 20,5 |
| Sang/produits sanguins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) receveur de sang | 40 | 21,7 | 16 | 21,1 | 8 | 13,6 | 9 | 9,7 | 12 | 11,9 | 5 | 4,5 | 5 | 4,0 | 6 | 4,8 | 5 | 4,63 | 2 | 2,9 | 1 | 2,8 | 109 | 10,1 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | 3 | 1,6 | 2 | 2,6 | 2 | 3,4 | 1 | 1,1 | 1 | 1,0 | 2 | 1,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0,0 | 12 | 1,1 |
| Contacts hétérosexuels/ endémie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| a) originaire d un pays de profil II | 66 | 35,9 | 18 | 23,7 | 23 | 39,0 | 28 | 30,1 | 30 | 29,7 | 25 | 22,7 | 30 | 24,0 | 29 | 23,4 | 26 | 24,1 | 18 | 26,5 | 7 | 19,4 | 300 | 27,7 |
| b) contacts sexuels avec une personne à risque | 59 | 32,1 | 30 | 39,5 | 17 | 28,8 | 35 | 37,6 | 38 | 37,6 | 47 | 42,7 | 53 | 42,4 | 52 | 41,9 | 45 | 41,7 | 23 | 33,8 | 12 | 33,3 | 411 | 37,9 |
| Exposition professionnelle | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| ARI - hétérosexuel | 5 | 2,7 | 2 | 2,6 | 0 | 0,0 | 2 | 2,2 | 1 | 1,0 | 4 | 3,6 | 4 | 3,2 | 4 | 3,2 | 3 | 2,78 | 2 | 2,9 | 2 | 5,6 | 29 | 2,7 |
| ARI | 6 | | 3 | | 6 | | 4 | | 8 | | 6 | | 3 | | 2 | | 5 | | 2 | | 1 | | 46 | |
| **Total[2]** | **190** | **100,0** | **79** | **100,0** | **65** | **100,0** | **97** | **100,0** | **109** | **100,0** | **116** | **100,0** | **128** | **100,0** | **126** | **100,0** | **113** | **100,0** | **70** | **100,0** | **37** | **100,0** | **1 130** | **100,0** |

[1] Les pourcentages sont fondés sur le nombre total moins les cas pour lesquels la catégorie d'exposition était inconnue (ARI).

[2] Dans deux cas, le sexe et (ou) le groupe d'âge n'étaient pas indiqués.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 14C.** Nombre de cas de sida et distribution en pourcentage par catégorie d'exposition et par année de diagnostic chez les adultes au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du diagnostic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | < 1989 | | 1989 | | 1990 | | 1991 | | 1992 | | 1993 | | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | Total | |
| **Catégorie d'exposition** | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | %[1] |
| HRH | 2 644 | 80,9 | 1 063 | 79,9 | 1 067 | 79,2 | 1 126 | 77,2 | 1 235 | 76,5 | 1 235 | 73,8 | 1 171 | 71,6 | 1021 | 69,5 | 576 | 60,1 | 259 | 54,9 | 135 | 50,2 | 11 532 | 74,4 |
| HRH/UDI | 111 | 3,4 | 52 | 3,9 | 62 | 4,6 | 66 | 4,5 | 77 | 4,8 | 88 | 5,3 | 99 | 6,1 | 76 | 5,2 | 53 | 5,5 | 19 | 4,0 | 10 | 3,7 | 713 | 4,6 |
| UDI | 37 | 1,1 | 33 | 2,5 | 36 | 2,7 | 65 | 4,5 | 74 | 4,6 | 98 | 5,9 | 122 | 7,5 | 126 | 8,6 | 119 | 12,4 | 66 | 14,0 | 43 | 16,0 | 819 | 5,3 |
| Sang/produits sanguins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) receveur de sang | 106 | 3,2 | 29 | 2,2 | 20 | 1,5 | 21 | 1,4 | 26 | 1,6 | 15 | 0,9 | 12 | 0,7 | 12 | 0,8 | 14 | 1,5 | 4 | 0,8 | 3 | 1,1 | 262 | 1,7 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | 63 | 1,9 | 31 | 2,3 | 34 | 2,5 | 31 | 2,1 | 29 | 1,8 | 18 | 1,1 | 21 | 1,3 | 22 | 1,5 | 14 | 1,5 | 6 | 1,5 | 3 | 1,1 | 272 | 1,8 |
| Contacts hétérosexuels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) originaire d un pays de profil II | 187 | 5,7 | 54 | 4,1 | 61 | 4,5 | 64 | 4,4 | 75 | 4,6 | 86 | 5,1 | 73 | 4,5 | 72 | 4,9 | 75 | 7,8 | 48 | 10,2 | 22 | 8,2 | 817 | 5,3 |
| b) contacts sexuels avec une personne à risque | 105 | 3,2 | 60 | 4,5 | 49 | 3,6 | 70 | 4,8 | 90 | 5,5 | 113 | 6,8 | 123 | 7,6 | 129 | 8,8 | 96 | 10,0 | 55 | 11,7 | 37 | 13,8 | 927 | 6,0 |
| Exposition professionnelle | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| ARI - hétérosexuel | 14 | 0,4 | 9 | 0,7 | 17 | 1,3 | 15 | 1,0 | 10 | 0,6 | 20 | 1,2 | 13 | 0,8 | 11 | 0,7 | 12 | 1,3 | 13 | 2,8 | 16 | 5,9 | 150 | 1,0 |
| ARI | 81 | | 43 | | 65 | | 73 | | 75 | | 63 | | 46 | | 57 | | 26 | | 16 | | 8 | | 553 | |
| **Total[2]** | **3 348** | **100,0** | **1 374** | **100,0** | **1 412** | **100,0** | **1 531** | **100,0** | **1 691** | **100,0** | **1 737** | **100,0** | **1 680** | **100,0** | **1 526** | **100,0** | **985** | **100,0** | **487** | **100,0** | **277** | **100,0** | **16 048** | **100,0** |

[1] Les pourcentages sont fondés sur le nombre total moins les cas pour lesquels la catégorie d'exposition était inconnue (ARI).

[2] Dans deux cas, le sexe et (ou) le groupe d'âge n'étaient pas indiqués.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 14D.** Nombre de cas de sida et distribution en pourcentage par catégorie d'exposition et par année de diagnostic chez les enfants au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du diagnostic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | < 1989 | | 1989 | | 1990 | | 1991 | | 1992 | | 1993 | | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | | |
| **Catégorie d'exposition** | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | %[1] |
| Sang/produits sanguins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) receveur de sang | 9 | 18,4 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 1 | 7,1 | 2 | 13,3 | 3 | 13,0 | 1 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 10,7 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | 1 | 2,0 | 3 | 25,0 | 3 | 30,0 | 1 | 7,7 | 2 | 11,8 | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 6,2 |
| Exposition périnatale | 39 | 79,6 | 9 | 75,0 | 6 | 60,0 | 12 | 92,3 | 13 | 76,5 | 13 | 92,9 | 12 | 80,0 | 20 | 87,0 | 12 | 92,3 | 9 | 100,0 | 2 | 100,0 | 147 | 82,6 |
| ARI | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 10 | |
| **Total[2]** | **49** | **100,0** | **12** | **100,0** | **11** | **100,0** | **13** | **100,0** | **18** | **100,0** | **14** | **100,0** | **18** | **100,0** | **25** | **100,0** | **15** | **100,0** | **10** | **100,0** | **2** | **100,0** | **187** | **100,0** |

[1] Les pourcentages sont fondés sur le nombre total moins les cas pour lesquels la catégorie d'exposition était inconnue (ARI).

[2] Dans deux cas, le sexe et (ou) le groupe d'âge n'étaient pas indiqués.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

M121

IMPORTANT NOTE CONCERNING THE FOLLOWING PAGES

THE PAGES WHICH FOLLOW HAVE BEEN FILMED TWICE IN ORDER TO OBTAIN THE BEST REPRODUCTIVE QUALITY

USERS SHOULD CONSULT ALL THE PAGES REPRODUCED ON THE FICHE IN ORDER TO OBTAIN A COMPLETE READING OF THE TEXT.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAGES QUI SUIVENT

LES PAGES SUIVANTES ONT ÉTÉ REPRODUITES EN DOUBLE AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE REPRODUCTION

LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER TOUTES LES PAGES REPRODUITES SUR LA FICHE AFIN D'OBTENIR LA LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

**Tableau 14E.** Nombre total de cas de sida par catégorie d'exposition et par groupe d'âge au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Groupe d'âge | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Enfants | | | | | Adultes | | | | | | |
| Catégorie d'exposition | < 1 an | 1 à 4 ans | 5 à 9 ans | 10 à 14 ans | **Total Enfants** | 15 à 19 ans | 20 à 29 ans | 30 à 39 ans | 40 à 49 ans | 50 ans et + | **Total Adultes** | |
| HRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 707 | 5 290 | 3 379 | 1 147 | 11 532 | 11 532 |
| HRH/UDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 | 334 | 134 | 29 | 713 | 713 |
| UDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 196 | 417 | 168 | 35 | 819 | 819 |
| Sang/produits sanguins | | | | | | | | | | | | |
| a) receveur de sang | 1 | 3 | 3 | 12 | 19 | 3 | 31 | 52 | 46 | 130 | 262 | 281 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 30 | 74 | 78 | 52 | 39 | 273 | 284 |
| Contacts hétérosexuels/endémie | | | | | | | | | | | | 0 |
| a) originaire d un pays de profil II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 | 395 | 156 | 79 | 816 | 816 |
| b) contacts sexuels avec une personne à risque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 | 319 | 231 | 192 | 927 | 927 |
| Exposition professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ARI - hétérosexuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 36 | 49 | 43 | 150 | 150 |
| Exposition périnatale | 78 | 53 | 15 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| ARI | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 97 | 200 | 134 | 121 | 553 | 563 |
| **Total**[1] | **84** | **59** | **22** | **22** | **187** | **56** | **2 704** | **7 122** | **4 350** | **1 816** | **16 048** | **16 235** |

[1] Dans un cas, le groupe d'âge n'a pas été signalé

Source Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999

**Tableau 14E.** Nombre total de cas de sida par catégorie d'exposition et par groupe d'âge au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Groupe d'âge | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Enfants | | | | | Adultes | | | | | | |
| Catégorie d'exposition | < 1 an | 1 à 4 ans | 5 à 9 ans | 10 à 14 ans | Total Enfants | 15 à 19 ans | 20 à 29 ans | 30 à 39 ans | 40 à 49 ans | 50 ans et + | Total Adultes | |
| HRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 707 | 5 290 | 3 379 | 1 147 | 11 532 | 11 532 |
| HRH/UDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 | 334 | 134 | 29 | 713 | 713 |
| UDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 196 | 417 | 168 | 35 | 819 | 819 |
| Sang/produits sanguins | | | | | | | | | | | | |
| a) receveur de sang | 1 | 3 | 3 | 12 | 19 | 3 | 31 | 52 | 46 | 130 | 262 | 281 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 30 | 74 | 78 | 52 | 39 | 273 | 284 |
| Contacts hétérosexuels/endémie | | | | | | | | | | | | 0 |
| a) originaire d'un pays de profil II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 | 395 | 156 | 79 | 816 | 816 |
| b) contacts sexuels avec une personne à risque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 | 319 | 231 | 192 | 927 | 927 |
| Exposition professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ARI - hétérosexuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 36 | 49 | 43 | 150 | 150 |
| Exposition périnatale | 78 | 53 | 15 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| ARI | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 97 | 200 | 134 | 121 | 553 | 563 |
| **Total**[1] | **84** | **59** | **22** | **22** | **187** | **56** | **2 704** | **7 122** | **4 350** | **1 816** | **16 048** | **16 235** |

[1] Dans un cas, le groupe d'âge n'a pas été signalé.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998,* Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 15A.** Nombre de cas de sida déclarés par province/territoire et par sexe au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Nombre de cas | | Ratio |
|---|---|---|---|
| **Province/territoire** | Hommes | Femmes | Hommes:femmes |
| C.-B. | 2 477 | 114 | 22:1 |
| Yukon | 5 | 0 | |
| Alberta | 903 | 53 | 17:1 |
| T.N.-O. | 11 | 5 | 2:1 |
| Sask. | 116 | 17 | 7:1 |
| Man. | 156 | 11 | 14:1 |
| Ont. | 6 145 | 368 | 17:1 |
| Qc[1] | 4 780 | 604 | 8:1 |
| N.-B. | 116 | 13 | 9:1 |
| Î.-P.-É. et N.-É. | 249 | 19 | 13:1 |
| T.-N. | 58 | 14 | 4:1 |
| **Total[2]** | **15 016** | **1 218** | **12:1** |

[1] L'écart entre le nombre signalé au LLCM et celui déclaré par le Québec n'est que d'un cas.

[2] Dans deux cas, le sexe et (ou) le groupe d'âge n'étaient pas indiqués.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 15B.** Nombre de cas de sida déclarés par province/territoire et par année du diagnostic chez les hommes, tous âges confondus, au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du diagnostic | | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province/territoire | < 1989 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | n | % |
| C.-B. | 500 | 221 | 221 | 257 | 277 | 281 | 275 | 236 | 142 | 38 | 29 | 2 477 | 16,5 |
| Yukon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,0 |
| Alberta | 154 | 76 | 76 | 78 | 97 | 92 | 115 | 90 | 63 | 40 | 22 | 903 | 6,0 |
| T.N.-O. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0,1 |
| Sask. | 27 | 7 | 16 | 6 | 6 | 12 | 13 | 14 | 4 | 6 | 5 | 116 | 0,8 |
| Man. | 28 | 16 | 11 | 21 | 17 | 15 | 14 | 15 | 9 | 2 | 8 | 156 | 1,0 |
| Ont. | 1 362 | 524 | 589 | 588 | 672 | 671 | 584 | 548 | 337 | 173 | 97 | 6 145 | 40,9 |
| Qc[1] | 1 039 | 426 | 407 | 450 | 486 | 503 | 500 | 457 | 297 | 149 | 66 | 4 780 | 31,8 |
| N.-B. | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 6 | 3 | 1 | 116 | 0,8 |
| Î.-P.-É. et N.-É. | 43 | 15 | 14 | 22 | 23 | 31 | 35 | 30 | 17 | 10 | 9 | 249 | 1,7 |
| T.-N. | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 58 | 0,4 |
| **Total[2]** | **3 182** | **1 303** | **1 353** | **1 441** | **1 595** | **1 625** | **1 560** | **1 413** | **880** | **423** | **241** | **15 016** | **100,0** |

[1] L'écart entre le nombre signalé au LLCM et celui déclaré par le Québec n'est que d'un cas.

[2] Dans deux cas, le sexe n'était pas indiqué.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 15C.** Nombre de cas de sida déclarés par province/territoire, par année du diagnostic, chez les femmes, tous âges confondus, au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du diagnostic | | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province/territoire | < 1989 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | n | % |
| C.-B. | 15 | 2 | 2 | 7 | 11 | 15 | 16 | 20 | 12 | 9 | 5 | 114 | 9,4 |
| Yukon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Alberta | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 53 | 4,4 |
| T.N.-O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,4 |
| Sask. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1,4 |
| Man. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0,9 |
| Ont. | 43 | 19 | 29 | 37 | 35 | 36 | 40 | 46 | 38 | 27 | 18 | 368 | 30,2 |
| Qc | 138 | 50 | 35 | 52 | 51 | 64 | 63 | 58 | 58 | 27 | 8 | 604 | 49,6 |
| N.-B. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1,1 |
| Î.-P.-É. et N.-É. | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,6 |
| T.-N. | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1,1 |
| **Total[1]** | **215** | **83** | **70** | **103** | **114** | **126** | **138** | **137** | **119** | **75** | **38** | **1 218** | **100,0** |

[1] Dans deux cas, le sexe n'était pas signalé.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 15D.** Nombre total de cas de sida déclarés par province/territoire et par année du diagnostic, tous âges confondus, au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Année du diagnostic | | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province/territoire | < 1989 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | n | % |
| C.-B. | 515 | 223 | 223 | 264 | 288 | 296 | 291 | 256 | 154 | 47 | 34 | 2 591 | 16,0 |
| Yukon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,0 |
| Alberta | 163 | 80 | 76 | 82 | 102 | 97 | 123 | 97 | 68 | 45 | 24 | 957 | 5,9 |
| T.N.-O. | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0,1 |
| Sask. | 29 | 8 | 17 | 6 | 11 | 12 | 15 | 16 | 4 | 9 | 6 | 133 | 0,8 |
| Man. | 29 | 16 | 11 | 23 | 17 | 15 | 15 | 16 | 11 | 4 | 10 | 167 | 1,0 |
| Ont. | 1 405 | 543 | 618 | 625 | 707 | 707 | 624 | 594 | 376 | 200 | 115 | 6 514 | 40,1 |
| Qc[1] | 1 177 | 476 | 442 | 502 | 537 | 567 | 563 | 515 | 355 | 176 | 74 | 5 384 | 33,2 |
| N.-B. | 19 | 14 | 13 | 12 | 11 | 17 | 15 | 16 | 7 | 4 | 1 | 129 | 0,8 |
| Î.-P.-É. et N.-É. | 46 | 18 | 15 | 23 | 27 | 34 | 37 | 32 | 17 | 10 | 9 | 268 | 1,7 |
| T.-N. | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 72 | 0,4 |
| **Total** | **3 397** | **1 386** | **1 423** | **1 544** | **1 709** | **1 751** | **1 698** | **1 551** | **1 000** | **498** | **279** | **16 236** | **100,0** |

[1] L'écart entre le nombre signalé au LLCM et celui déclaré par le Québec n'est que d'un cas.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

**Tableau 16.** Nombre de cas de sida et distribution en pourcentage, par catégorie d'exposition et par province/territoire, au Canada, cas diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Province/territoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C.-B. | | Yukon | | Alberta | | T.N.-O. | | Sask. | | Man. | | Ont. | | Qc | | N.-B. | | Î.-P.-É. et N.-É. | | T.-N. | | Total | |
| **Catégorie d'exposition** | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| HRH | 2 091 | 82,1 | 2 | 40,0 | 695 | 74,6 | 5 | 31,3 | 70 | 53,8 | 114 | 70,8 | 4 794 | 77,3 | 3 461 | 66,2 | 70 | 55,1 | 198 | 77,0 | 32 | 44,4 | 11 532 | 73,6 |
| HRH/UDI | 126 | 4,9 | 1 | 20,0 | 57 | 6,1 | 1 | 6,3 | 11 | 8,5 | 8 | 5,0 | 245 | 4,0 | 250 | 4,8 | 6 | 4,7 | 7 | 2,7 | 1 | 1,4 | 713 | 4,5 |
| UDI | 158 | 6,2 | 1 | 20,0 | 53 | 5,7 | 0 | 0,0 | 8 | 6,2 | 9 | 5,6 | 238 | 3,8 | 333 | 6,4 | 7 | 5,5 | 10 | 3,9 | 2 | 2,8 | 819 | 5,2 |
| Sang/produits sanguins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) receveur de sang | 19 | 0,7 | 0 | 0,0 | 25 | 2,7 | 1 | 6,3 | 7 | 5,4 | 3 | 1,9 | 125 | 2,0 | 83 | 1,6 | 4 | 3,1 | 10 | 3,9 | 4 | 5,6 | 281 | 1,8 |
| b) receveur de facteurs de coagulation | 26 | 1,0 | 0 | 0,0 | 19 | 2,0 | 0 | 0,0 | 17 | 13,1 | 11 | 6,8 | 93 | 1,5 | 79 | 1,5 | 22 | 17,3 | 9 | 3,5 | 8 | 11,1 | 284 | 1,8 |
| Contacts hétérosexuels/ endémie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) originaire d un pays de profil II | 17 | 0,7 | 0 | 0,0 | 15 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 4,3 | 189 | 3,0 | 584 | 11,2 | 1 | 0,8 | 4 | 1,6 | 0 | 0,0 | 817 | 5,2 |
| b) contacts sexuels avec une personne à risque | 94 | 3,7 | 1 | 20,0 | 57 | 6,1 | 8 | 50,0 | 15 | 11,5 | 7 | 4,3 | 477 | 7,7 | 213 | 4,1 | 16 | 12,6 | 19 | 7,4 | 20 | 27,8 | 927 | 5,9 |
| Exposition professionnelle | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Transmission périnatale | 13 | 0,5 | 0 | 0,0 | 5 | 0,5 | 1 | 6,3 | 1 | 0,8 | 2 | 1,2 | 36 | 0,6 | 84 | 1,6 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 4 | 5,6 | 147 | 0,9 |
| ARI - hétérosexuel | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 6 | 0,6 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 140 | 2,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 150 | 1,0 |
| ARI | 45 | | 0 | | 25 | | 0 | | 3 | | 6 | | 315 | | 156 | | 2 | | 11 | | 0 | | 563 | |
| **Total** | **2 591** | **100,0** | **5** | **100,0** | **957** | **100,0** | **16** | **100,0** | **133** | **100,0** | **167** | **100,0** | **6 514** | **100,0** | **5 384** | **100,0** | **129** | **100,0** | **268** | **100,0** | **72** | **100,0** | **16 236** | **100,0** |

Les pourcentages sont fondés sur le nombre total moins les cas pour lesquels la catégorie d'exposition était inconnue (ARI).

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998,* Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

De nombreux médecins ont recueilli systématiquement des renseignements sur l'origine ethnique des personnes atteintes du sida, depuis le début de l'épidémie du VIH/sida. Même si ces données ont été recueillies et signalées, elles n'ont pas été intégrées régulièrement aux rapports de surveillance du VIH/sida. Or, le nombre de demandes d'information sur l'origine ethnique ne cesse de croître.

Ces données démographiques pourraient s'avérer extrêmement utiles aux groupes d'intervenants en santé communautaire et aux responsables de la santé publique à l'étape de la planification de programmes d'action communautaire et de campagnes de santé publique destinés à réduire le nombre d'infections à VIH et à traiter les personnes touchées dans leurs collectivités respectives. Ces éléments d'information pourraient aussi aider les intervenants en santé communautaire à mieux cibler leurs efforts de prévention, puisqu'ils connaîtraient les tendances relatives au VIH/sida, selon le sexe, le groupe à risque, le groupe d'âge et l'origine ethnique.

L'intégration des donnnées concernant l'origine ethnique aux données de surveillance du sida comporte plusieurs limites importantes. Au moment où le sida est diagnostiqué, les médecins sont priés de demander aux personnes visées par le diagnostic de les aider à déterminer leur origine ethnique. Un manque de rigueur dans le processus de consultation peut entraîner des erreurs de classification.

Il arrive que des patients appartenant à certaines communautés refusent de révéler leur origine ethnique, ce qui se traduit par une sous-représentation. De plus, il est possible que les patients et les médecins se servent d'une liste établie qui restreint artificiellement les choix et fausse les renseignements. Enfin, il existe un écart important dans l'intégralité des déclarations de ce type faites d'une région à l'autre, ce qui peut entraîner une sous-représentation systématique de certaines communautés.

Il faut faire preuve de circonspection dans l'interprétation des données, puisqu'il n'existe aucun mécanisme permettant de valider les renseignements sur l'origine ethnique déclarée. Il faut se garder de tirer, à partir des données sur l'origine ethnique, des conclusions concernant la présence du VIH/sida dans certains groupes d'individus, et se contenter de n'appliquer l'information qu'aux cas de sida signalés. Nous nous employons actuellement à revoir les critères relatifs à la déclaration des données sur l'ethnicité. Vos suggestions sont les bienvenues.

**Tableau 17.** Nombre et distribution en pourcentage de tous les cas de sida diagnostiqués au 31 décembre 1998, par origine ethnique au Canada; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| Année de la déclaration du sida | Autochtone[1] | Habitant de l'Asie du Sud/ Habitant de l'Asie/Arabe[2] | Asiatique[3] | Noir[4] | Latino-américain[5] | Blanc | Groupe ethnique non signalé | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1989 | 33 | 36 | 22 | 240 | 25 | 2 233 | 808 | 3 397 |
| 1989 | 15 | 16 | 10 | 65 | 18 | 1 105 | 157 | 1 386 |
| 1990 | 14 | 17 | 17 | 68 | 15 | 1 042 | 250 | 1 423 |
| 1991 | 30 | 11 | 16 | 77 | 9 | 1 132 | 269 | 1 544 |
| 1992 | 27 | 23 | 19 | 87 | 21 | 1 253 | 279 | 1 709 |
| 1993 | 33 | 23 | 19 | 101 | 27 | 1 265 | 283 | 1 751 |
| 1994 | 36 | 23 | 23 | 81 | 19 | 1 200 | 316 | 1 698 |
| 1995 | 48 | 25 | 29 | 72 | 12 | 971 | 394 | 1 551 |
| 1996 | 39 | 6 | 16 | 42 | 9 | 485 | 403 | 1 000 |
| 1997 | 25 | 1 | 9 | 26 | 9 | 207 | 221 | 498 |
| 1998 | 21 | 6 | 5 | 15 | 5 | 140 | 87 | 279 |
| **Total** | **321** | **187** | **185** | **874** | **169** | **11 033** | **3 467** | **16 236** |

[1] Comprend les Inuits, les Métis, les Indiens autochtones et les autres Autochtones.

[2] Par exemple, les Indiens d'Asie, les Pakistanais, les Sri Lankais, les Punjabis, les Bangladeshis, les Arméniens, les Égyptiens, les Iraniens, les Libanais, les Marocains.

[3] Par exemple, les Chinois, les Japonais, les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Indonésiens, les Laotiens, les Coréens, les Philippins.

[4] Par exemple, les Africains, les Haïtiens, les Jamaïcains, les Somaliens.

[5] Par exemple, les Mexicains, les habitants de l'Amérique centrale/de l'Amérique du Sud.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

Le tableau 18 indique le nombre de décès attribuables au sida, déclarés au LLCM. Les informations sur les décès sont importantes car elles permettent d'estimer le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida ainsi que les effets du traitement. Il importe toutefois de signaler que le nombre de décès chez les cas de sida présentés ici est sans doute une sous-estimation, et cela, pour différentes raisons. D'abord, il faut tenir compte des retards de déclaration et de la sous-déclaration des décès attribuables au sida, comme c'est le cas pour la déclaration des cas de sida. Il peut aussi arriver que les décès de personnes atteintes du sida, mais attribuables à d'autres causes, ne soient pas déclarés au LLCM. De plus, dans certains cas, même si le sida est peut-être indiqué comme cause de décès par un médecin traitant, ce fait peut ne jamais être déclaré au LLCM (comme mise à jour de la situation). Pour toutes ces raisons, il faut faire preuve de prudence lorsqu'on interprète les données sur les décès attribués au VIH/sida. Nous ne recommandons pas d'utiliser la différence entre le nombre total de cas de sida déclarés et le nombre total de décès pour établir le nombre total de personnes vivant avec le sida.

**Tableau 18.** Nombre de décès déclarés et total cumulatif, par année de décès au Canada, cas diagnostiqués au 31 décembre 1998; dernières données déclarées au LLCM au 26 février 1999

| | Adultes | | Enfants | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année du décès | Nombre | Cumulatif | Nombre | Cumulatif | Nombre | Cumulatif |
| < 1989 | 1 762 | 1 762 | 30 | 30 | 1 792 | 1 792 |
| 1989 | 792 | 2 554 | 6 | 36 | 798 | 2 590 |
| 1990 | 878 | 3 432 | 4 | 40 | 882 | 3 472 |
| 1991 | 1 036 | 4 468 | 7 | 47 | 1 043 | 4 515 |
| 1992 | 1 247 | 5 715 | 12 | 59 | 1 259 | 5 774 |
| 1993 | 1 362 | 7 077 | 14 | 73 | 1 376 | 7 150 |
| 1994 | 1 397 | 8 474 | 14 | 87 | 1 411 | 8 561 |
| 1995 | 1 411 | 9 885 | 10 | 97 | 1 421 | 9 982 |
| 1996 | 984 | 10 869 | 6 | 103 | 990 | 10 972 |
| 1997 | 407 | 11 276 | 4 | 107 | 411 | 11 383 |
| 1998 | 151 | 11 427 | 0 | 107 | 151 | 11 534 |
| **Total**[1] | **11 427** | | **107** | | **11 534** | |

[1] Le total comprend 209 cas de sida, dont 207 chez les adultes et 2 chez les enfants, pour lesquels l'année du décès est inconnue.

Source : Santé Canada, *Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date du 31 décembre 1998*, Division de la surveillance du VIH/sida, Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose, LLCM, DGPS, Santé Canada, avril 1999.

# SECTION IV

## Statistiques mondiales sur le sida

| PAYS | Nombre de cas déclarés | Population | Date de notification | Taux pour 100 000 |
|---|---|---|---|---|
| **AFRIQUE** | | | | |
| AFRIQUE DU SUD | 12 825 | 42 327 458 | Oct. 96 | 30,30 |
| ALGÉRIE | 363 | 29 830 370 | Sept. 98 | 1,22 |
| ANGOLA | 1 926 | 10 548 847 | Août 97 | 18,26 |
| BÉNIN | 2 813 | 5 902 178 | Juin 98 | 47,66 |
| BOTSWANA | 7 150 | 1 500 765 | Juin 98 | 476,42 |
| BURKINA FASO | 11 352 | 10 891 159 | Fév. 98 | 104,23 |
| BURUNDI | 9 239 | 6 052 614 | Déc. 97 | 152,64 |
| CAMEROUN | 13 576 | 14 677 510 | Juin 98 | 92,50 |
| CAP-VERT | 226 | 393 943 | Déc. 97 | 57,37 |
| COMOROS | 18 | 528 893 | Nov. 97 | 3,40 |
| CONGO | 10 223 | 2 583 198 | Sept. 96 | 395,75 |
| CÔTE D IVOIRE | 37 898 | 14 986 218 | Juillet 97 | 252,89 |
| RÉP. DÉM. DU CONGO | 38 426 | 47 440 362 | Janv. 98 | 81,00 |
| DJIBOUTI | 1 707 | 434 116 | Août 98 | 393,21 |
| ÉGYPTE | 191 | 64 824 466 | Juin 98 | 0,29 |
| ERYTHRÉE | 4 890 | 3 589 687 | Juin 98 | 136,22 |
| ÉTHIOPIE | 21 553 | 58 732 577 | Oct. 97 | 36,70 |
| GABON | 1 660 | 1 190 159 | Déc. 97 | 139,48 |
| GAMBIA | 573 | 1 248 085 | Oct. 98 | 45,91 |
| GHANA | 24 692 | 18 100 703 | Mai 98 | 136,41 |
| GUINÉE | 4 085 | 7 405 375 | Juin 98 | 55,16 |
| GUINÉE-BISSAU | 823 | 1 178 584 | Oct. 96 | 69,83 |
| GUINÉE ÉQUATORIALE | 321 | 442 516 | Nov. 98 | 72,54 |
| KENYA | 81 492 | 28 803 085 | Sept. 98 | 282,93 |
| LESOTHO | 5 366 | 2 007 814 | Sept. 98 | 267,26 |
| LIBÉRIA | 232 | 2 602 068 | Mars 98 | 8,92 |
| JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE | 17 | 5 648 359 | Déc. 95 | 0,30 |
| MADAGASCAR | 36 | 14 061 627 | Mars 98 | 0,26 |
| MALAWI | 50 975 | 9 609 081 | Juin 97 | 530,49 |
| MALI | 4 519 | 9 788 904 | Mai 98 | 46,16 |
| MAROC | 510 | 30 391 423 | Juin 98 | 1,68 |
| MAURITANIE | 532 | 2 411 317 | Mai 97 | 22,06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MAURICE | 44 | 1 154 272 | Sept. 98 | 3,81 |
| MOZAMBIQUE | 8 678 | 18 165 476 | Juin 98 | 47,77 |
| NAMIBIE | 6 784 | 1 727 183 | Mars 97 | 392,78 |
| NIGER | 3 393 | 9 388 859 | Août 98 | 36,14 |
| NIGÉRIA | 21 905 | 107 129 469 | Mars 98 | 20,45 |
| OUGANDA | 53 306 | 20 604 874 | Déc. 97 | 258,71 |
| RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 7 016 | 3 342 051 | Mai 97 | 209,93 |
| RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE | 97 621 | 29 460 753 | Déc. 97 | 331,36 |
| RÉUNION | 166 | 692 204 | Déc. 95 | 23,98 |
| RWANDA | 15 903 | 7 737 537 | Déc. 97 | 205,53 |
| SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE | 27 | 147 865 | Déc. 97 | 18,26 |
| SÉNÉGAL | 2 393 | 9 403 546 | Nov. 97 | 25,45 |
| SEYCHELLES | 30 | 78 107 | Fév. 98 | 38,41 |
| SIERRA LEONE | 205 | 4 891 546 | Juin 96 | 4,19 |
| SOMALIE | 13 | 6 590 325 | Déc. 90 | 0,20 |
| SUDAN | 2 067 | 32 594 128 | Juin 98 | 6,34 |
| SWAZILAND | 2 939 | 1 031 600 | Juin 98 | 284,90 |
| TCHAD | 8 339 | 7 166 023 | Juin 98 | 116,37 |
| TOGO | 9 204 | 4 735 610 | Mars 98 | 194,36 |
| TUNISIE | 465 | 9 245 284 | Mars 98 | 5,03 |
| ZAMBIE | 44 942 | 9 349 975 | Juillet 97 | 480,66 |
| ZIMBABWE | 70 669 | 11 423 175 | Déc. 97 | 618,65 |
| **TOTAL** | **706 318** | | | |

| PAYS | Nombre de cas déclarés | Population | Date de notification | Taux pour 100 000 |
|---|---|---|---|---|
| **AMÉRIQUE DU NORD** | | | | |
| CANADA | 16 236 | 30 337 334 | Avril 99 | 53,52 |
| ÉTATS-UNIS | 691 647 | 267 954 764 | Août 98 | 258,12 |
| MEXIQUE | 35 069 | 97 563 374 | Mars 98 | 35,94 |
| **TOTAL** | **742 952** | | | |

| PAYS | Nombre de cas déclarés | Population | Date de notification | Taux pour 100 000 |
|---|---|---|---|---|
| **AMÉRIQUE DU SUD ET AMÉRIQUE CENTRALE** | | | | |
| ANGUILLA | 5 | 10 785 | Déc. 95 | 46,36 |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | 91 | 63 739 | Janv. 98 | 142,77 |
| ANTILLES NÉERLANDAISES ET ARUBA | 257 | 279 124 | Mars 96 | 92,07 |
| ARGENTINE | 13 113 | 35 797 985 | Août 98 | 36,63 |
| BAHAMAS | 2 864 | 275 941 | Sept. 97 | 1037,90 |
| BARBADE | 875 | 258 756 | Mars 98 | 338,16 |
| BELIZE | 198 | 224 663 | Déc. 96 | 88,13 |
| BERMUDES | 335 | 62 569 | Juillet 97 | 535,41 |
| BOLIVIE | 179 | 7 669 868 | Avril 98 | 2,33 |
| BRÉZIL | 128 821 | 164 511 366 | Fév. 98 | 78,31 |
| CHILI | 2 431 | 14 508 158 | Août 98 | 16,76 |
| COLOMBIE | 8 433 | 37 418 290 | Déc. 97 | 22,54 |
| COSTA RICA | 1 383 | 3 534 174 | Déc. 97 | 39,13 |
| CUBA | 743 | 10 999 041 | Juillet 98 | 6,76 |
| DOMINIQUE | 72 | 66 633 | Juin 98 | 108,05 |
| ÉQUATEUR | 625 | 12 105 124 | Août 97 | 5,16 |
| EL SALVADOR | 2 344 | 5 661 827 | Août 98 | 41,40 |
| GUYANE FRANÇAISE | 641 | 156 946 | Déc. 97 | 408,42 |
| GRENADA | 103 | 95 537 | Nov. 97 | 107,81 |
| GUADELOUPE | 790 | 411 823 | Déc. 97 | 191,83 |
| GUATEMALA | 2 395 | 11 685 695 | Avril 98 | 20,50 |
| GUYANA | 984 | 706 116 | Juin 98 | 139,35 |
| HAÏTI | 4 967 | 6 611 407 | Janv. 94 | 75,13 |
| HONDURAS | 8 217 | 5 751 384 | Janv. 98 | 142,87 |
| ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | 16 | 13 368 | Août 98 | 119,69 |
| ÎLES CAÏMANES | 22 | 36 153 | Janv. 98 | 60,85 |
| ÎLES TURQUES ET CAÏQUES | 39 | 14 631 | Nov. 93 | 266,56 |
| JAMAÏQUE | 2 430 | 2 615 582 | Nov. 97 | 92,90 |
| MARTINIQUE | 436 | 402 984 | Déc. 97 | 108,19 |
| MONTSERRAT | 7 | 12 800 | Juillet 97 | 54,69 |
| NICARAGUA | 180 | 4 386 399 | Avril 98 | 4,10 |
| PANAMA | 1 620 | 2 693 417 | Fév. 98 | 60,15 |
| PARAGUAY | 424 | 5 651 634 | Juillet 98 | 7,50 |
| PÉROU | 7 331 | 25 573 924 | Avril 98 | 28,67 |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 4 230 | 7 868 731 | Mai 98 | 53,76 |
| SAINT-KITTS-ET-NEVIS | 58 | 41 803 | Sept. 97 | 138,75 |
| SAINTE-LUCIE | 109 | 150 630 | Août 98 | 72,36 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | 111 | 119 092 | Nov. 97 | 93,21 |
| SURINAME | 211 | 424 569 | Déc. 96 | 49,70 |
| TRINIDAD ET TOBAGO | 2 613 | 1 130 337 | Juillet 97 | 231,17 |
| URUGUAY | 1 119 | 3 270 707 | Août 98 | 34,21 |
| VENEZUELA | 7 282 | 22 396 407 | Avril 98 | 32,51 |
| **TOTAL** | **209 104** | | | |

| PAYS | Nombre de cas déclarés | Population | Date de notification | Taux pour 100 000 |
|---|---|---|---|---|
| **ASIE** | | | | |
| AFGHANISTAN | 0 | 23 738 085 | Déc. 91 | 0,00 |
| ARABIE SAOUDITE | 373 | 20 087 965 | Juin 98 | 1,86 |
| ARMÉNIE | 13 | 3 433 629 | Mars 98 | 0,38 |
| AZERBAIJAN | 10 | 7 797 476 | Juin 98 | 0,13 |
| BAHRAIN | 53 | 603 318 | Juin 98 | 8,78 |
| BANGLADESH | 10 | 125 340 261 | Mars 98 | 0,01 |
| BHOUTAN | 0 | 1 865 191 | Nov. 96 | 0,00 |
| BRUNÉI DARUSSALAM | 12 | 307 616 | Sept. 98 | 3,90 |
| CAMBODGE | 1 379 | 11 163 861 | Août 98 | 12,35 |
| CHINE | 301 | 1 221 591 778 | Mars 98 | 0,02 |
| CHYPRE | 58 | 752 808 | Sept. 97 | 7,70 |
| CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA | 29 | | Juin 98 | |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | 8 | 2 262 309 | Déc. 90 | 0,35 |
| GÉORGIE | 22 | 5 160 042 | Mars 98 | 0,43 |
| HONG KONG | 349 | 6 547 189 | Sept. 98 | 5,33 |
| INDE | 6 252 | 966 783 171 | Mars 98 | 0,65 |
| INDONÉSIE | 218 | 209 774 138 | Sept. 98 | 0,10 |
| IRAN | 194 | 67 540 002 | Déc. 97 | 0,29 |
| IRAQ | 106 | 22 219 289 | Juin 98 | 0,48 |
| ISRAËL | 480 | 5 534 672 | Juin 98 | 8,67 |
| JAPON | 1 897 | 125 732 794 | Août 98 | 1,51 |
| JORDANIE | 66 | 4 324 638 | Juin 98 | 1,53 |
| KAZAKHSTAN | 14 | 16 881 793 | Juin 98 | 0,08 |
| KOWEÏT | 29 | 1 834 269 | Juin 98 | 1,58 |
| KIRGHIZISTAN | 0 | 4 512 809 | Juin 98 | 0,00 |
| LIBAN | 98 | 3 449 578 | Déc. 97 | 2,84 |
| MACAO | 13 | 502 325 | Juin 98 | 2,59 |
| MALAISIE | 1 804 | 20 491 303 | Sept. 98 | 8,80 |
| MALDIVES | 5 | 280 391 | Avril 97 | 1,78 |
| MONGOLIE | 0 | 2 538 211 | Sept. 98 | 0,00 |
| MYANMAR | 2 568 | 46 821 943 | Mars 98 | 5,48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NÉPAL | 225 | 23 107 464 | Août 98 | 0,97 |
| OMAN | 165 | 2 264 590 | Juin 98 | 7,29 |
| OUZBÉKISTAN | 5 | 23 467 724 | Déc. 97 | 0,02 |
| PAKISTAN | 154 | 132 185 299 | Juin 98 | 0,12 |
| PHILIPPINES | 343 | 76 103 564 | Sept. 98 | 0,45 |
| QATAR | 88 | 670 274 | Mars 98 | 13,13 |
| RÉP. ARABE SYRIENNE | 56 | 16 137 899 | Mars 98 | 0,35 |
| RÉPUBLIQUE DE CORÉE | 115 | 45 948 811 | Juin 98 | 0,25 |
| RÉP. DÉM. POP. DE CORÉE | 0 | 24 317 004 | Nov. 96 | 0,00 |
| RÉP. DÉM. POP. LAO | 91 | 5 116 959 | Mars 98 | 1,78 |
| SINGAPORE | 419 | 3 440 693 | Oct. 98 | 12,18 |
| SRI LANKA | 87 | 18 721 178 | Sept. 98 | 0,46 |
| TAJIKISTAN | 0 | 5 945 903 | Juin 98 | 0,00 |
| THAÏLANDE | 88 403 | 59 450 818 | Août 98 | 148,70 |
| TURQUIE | 272 | 63 528 225 | Juin 98 | 0,43 |
| TURKMÉNISTAN | 1 | 4 229 249 | Nov. 95 | 0,02 |
| VIET NAM | 1 819 | 75 123 880 | Sept. 98 | 2,42 |
| YEMEN | 134 | 13 972 477 | Mars 98 | 0,96 |
| **TOTAL** | **108 738** | | | |

| PAYS | Nombre de cas déclarés | Population | Date de notification | Taux pour 100 000 |
|---|---|---|---|---|
| **EUROPE** | | | | |
| ALBANIE | 11 | 3 299 757 | Juin 98 | 0,33 |
| ALLEMAGNE | 17 490 | 82 071 765 | Juin 98 | 21,31 |
| AUTRICHE | 1 826 | 8 132 505 | Juin 98 | 22,45 |
| BELARUS | 18 | 10 412 219 | Juin 98 | 0,17 |
| BELGIQUE | 2 474 | 10 165 059 | Juin 98 | 24,34 |
| BOSNIE-HERZÉGOVINE | 17 | 3 222 584 | Juin 97 | 0,53 |
| BULGARIE | 55 | 8 290 988 | Mars 98 | 0,66 |
| CROATIE | 129 | 4 664 710 | Juin 98 | 2,77 |
| DANEMARK | 2 138 | 5 305 048 | Juin 98 | 40,30 |
| ESPAGNE | 51 284 | 39 107 912 | Juin 98 | 131,13 |
| ESTONIE | 19 | 1 436 558 | Juin 98 | 1,32 |
| EX-RÉP. YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE | 26 | 1 995 859 | Juin 98 | 1,30 |
| FÉDÉRATION DE RUSSIE | 331 | 147 305 569 | Juin 98 | 0,22 |
| FINLANDE | 278 | 5 137 269 | Juin 98 | 5,41 |
| FRANCE | 48 453 | 58 609 285 | Juin 98 | 82,67 |
| GRÈCE | 1 811 | 10 616 055 | Juin 98 | 17,06 |
| HONGRIE | 297 | 10 232 404 | Juin 98 | 2,90 |
| IRLANDE | 647 | 3 606 952 | Juin 98 | 17,94 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ISLANDE | 45 | 269 697 | Juin 98 | 16,69 |
| ITALIE | 42 122 | 56 830 508 | Juin 98 | 74,12 |
| LETTONIE | 23 | 2 421 163 | Juin 98 | 0,95 |
| LITUANIE | 15 | 3 617 104 | Juin 98 | 0,41 |
| LUXEMBOURG | 131 | 420 416 | Juin 98 | 31,16 |
| MALTE | 46 | 377 177 | Juin 98 | 12,20 |
| MONACO | 40 | 31 892 | Juin 98 | 125,42 |
| NORVÈGE | 611 | 4 399 993 | Juin 96 | 13,89 |
| PAYS-BAS | 4 846 | 15 649 729 | Juin 98 | 30,97 |
| POLOGNE | 657 | 38 615 239 | Juin 98 | 1,70 |
| PORTUGAL | 5 133 | 9 931 045 | Juin 98 | 51,69 |
| RÉP. DE MOLDOVA | 19 | 4 457 206 | Juin 98 | 0,43 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 114 | 10 298 324 | Juin 98 | 1,11 |
| ROUMANIE | 5 407 | 22 463 077 | Juin 98 | 24,07 |
| ROYAUME-UNI | 15 572 | 57 591 677 | Juin 98 | 27,04 |
| SAINT-MARIN | 9 | 24 714 | Juin 98 | 36,42 |
| SLOVAQUIE | 19 | 5 387 665 | Juin 98 | 0,35 |
| SLOVÉNIE | 71 | 1 973 096 | Juin 98 | 3,60 |
| SUÈDE | 1 586 | 8 865 051 | Juin 98 | 17,89 |
| SUISSE | 6 334 | 7 240 463 | Juin 98 | 87,48 |
| UKRAINE | 535 | 50 447 719 | Juin 98 | 1,06 |
| YOUGOSLAVIE* | 713 | 11 223 853 | Juin 98 | 6,35 |
| **TOTAL** | **211 352** | | | |

* Concerne les États/territoires de l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie qui ne sont pas cités séparément.

| PAYS | Nombre de cas déclarés | Population | Date de notification | Taux pour 100 000 |
|---|---|---|---|---|
| **OCÉANIE** | | | | |
| AUSTRALIE | 7 766 | 18 438 824 | Sept. 98 | 42,12 |
| FIDJI | 8 | 792 441 | Août 98 | 1,01 |
| GUAM | 49 | 160 595 | Mars 98 | 30,51 |
| ÎLES COOK | 0 | 19 776 | Sept. 98 | 0,00 |
| ÎLES MARIANNES | 8 | 60 652 | Avril 98 | 13,19 |
| ÎLES MARSHALL | 2 | 60 652 | Fév. 98 | 3,30 |
| ÎLES SOLOMON | 0 | 426 855 | Août 97 | 0,00 |
| ÎLES WALLIS ET FUTUNA | 1 | 14 817 | Août 98 | 6,75 |
| KIRIBATI | 4 | 82 449 | Sept. 98 | 4,85 |
| MICRONÉSIE (États fédérés de) | 2 | 127 616 | Avril 98 | 1,57 |
| NAURU | 0 | 10 390 | Oct. 97 | 0,00 |
| NIUE | 0 | 1 706 | Sept. 98 | 0,00 |
| NOUVELLE-CALÉDONIE | 66 | 191 003 | Août 98 | 34,55 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOUVELLE-ZÉLANDE | 656 | 3 587 275 | Août 98 | 18,29 |
| PALAOS | 1 | 17 240 | Mars 98 | 5,80 |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 417 | 4 496 221 | Août 98 | 9,27 |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | 54 | 233 488 | Sept. 98 | 23,13 |
| SAMOA | 6 | 219 509 | Sept. 98 | 2,73 |
| SAMOA AMÉRICAINES | 0 | 61 819 | Sept. 98 | 0,00 |
| TOKELAU | 0 | 1 463 | Sept. 97 | 0,00 |
| TONGA | 14 | 107 335 | Sept. 98 | 13,04 |
| TUVALU | 0 | 10 297 | Oct. 97 | 0,00 |
| VANUATU | 0 | 181 358 | Sept. 98 | 0,00 |
| **TOTAL** | **9 054** | | | |
| **TOTAL MONDIAL** | **1 987 518** | | | |

Sources : Relevé épidémiologique hebdomadaire/Weekly Epidemiological Record, Organisation mondiale de la Santé, Surveillance mondiale du sida, 73, n° 48 : 27 novembre 1998, Genève, Suisse, tableau 1, pp. 373-74.
Central Intelligence Agency. (1997) World Factbook, 1997, [Online], accessible à l'adresse suivante http://www.ocdi.gov/cia/publications/factbook/index.html [1998. 26 juin].

# Annexe 1
# Guide d utilisation du système FAXlink

(A) À l'aide du combiné téléphonique de votre télécopieur, composez le (613) 941-3900 et attendez la réponse

(B) Le système FAXlink vous demandera de sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir les instructions et les documents.

Appuyez sur : (1) pour l'anglais, ou
(2) pour le français.

Veuillez noter que la langue sélectionnée s'applique à la fois aux instructions et au rapport que vous recevrez.

(C) Ensuite le système FAXlink vous demandera de sélectionner le domaine auquel vous désirez avoir accès.

Appuyez sur :

(1) pour des renseignements sur le sida; ou

(2) pour des renseignements sur la santé des voyageurs; ou

(3) pour obtenir des articles récents et antérieurs du RMTC; ou

(4) pour obtenir des rapports sur les maladies respiratoires ou les virus; ou

(9) pour sortir de FAXlink.

(D) Le système FAXlink vous demandera si vous souhaitez recevoir des instructions pour l'utilisation du système FAXlink ou savoir comment communiquer avec le Laboratoire de lutte contre la maladie, ou si vous voulez continuer. Appuyez sur : (2) pour continuer.

(E) Ensuite, le système FAXlink vous demandera si vous désirez recevoir un index des documents disponibles ou si vous voulez demander un ou des documents particuliers. Appuyez sur : (2) pour sélectionner un ou des documents de l'index.

(F) Vous pouvez maintenant sélectionner le ou les documents que vous désirez recevoir. Le système FAXlink vous demandera de composer le numéro du document demandé et d'appuyer sur la touche dièse (#). On vous demandera alors de confirmer votre sélection. Appuyez sur :

(1) si le code est exact, ou (2) s'il est inexact.

Ensuite, le système FAXlink vous demandera si vous souhaitez obtenir un autre document. Si vous ne voulez pas d'autres documents, appuyez sur la touche dièse pour mettre fin au mode de sélection. Si vous désirez un autre document, composez son numéro et ensuite appuyez sur la touche #. Le système FAXlink vous demandera de confirmer votre sélection.

Appuyez sur :

(1) si le code est exact, ou (2) s'il est inexact.

Continuez à suivre les instructions jusqu'à ce que vous ayez obtenu tous les documents que vous souhaitez recevoir.

(G) Pour vous permettre de recevoir les documents que vous avez choisi, le système FAXlink vous demandera d'appuyer sur le bouton RECEVOIR OU MARCHE de votre télécopieur après la tonalité.

Si vous éprouvez quelque difficulté que ce soit, veuillez composer le (613) 954-9285 ou (613) 957-0317.

# Annexe 2
# Sources des données

B.C. Centre for Disease Control
655 West 12th Avenue
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5Z 4R4

Provincial AIDS Program
Alberta Health, 9th Floor
10025 Jasper Ave.
Box 1360
Edmonton (Alberta)
T5J 2N3

Infectious Disease Control
Department of Health
P.O. Box 1320
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
X1A 2L9

Saskatchewan Health
3475 Albert St.
Regina (Saskatchewan)
S4S 6X6

Ministère de la Santé du Manitoba
Lutte contre les maladies contagieuses
Direction de la santé publique
800 avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
R3G 0N4

Communicable Disease Control Unit
Medical Services Branch, Yukon Region
No. 5 Hospital Rd.
Whitehorse (Yukon)
Y1A 3H7

Service de lutte contre la maladie et d'épidémiologie
Ministère de la Santé de l'Ontario
5700, rue Yonge, 8e étage
North York (Ontario)
M2M 4K2

Laboratoire du VIH
Service central de laboratoire d'hygiène
Ministère de la Santé de l'Ontario
81, rue Resources
Etobicoke (Ontario)
M9P 3T1

The Hospital for Sick Children
Department of Paediatrics
Division of Infectious Diseases
555 University Ave.
Toronto (Ontario)
M5G 1X8

Centre québécois de coordination sur le sida
Gouvernement du Québec
Place Ministère de la Santé et des Services sociaux
201 est, Crémazie, Bureau RC 03
Montréal (Québec)
H2M 1L2

Module prévention et contrôle MTS/sida
DSP Hôpital général de Montréal
1301 est, Sherbrooke
Montréal (Québec)
H2L 1M3

Laboratoire de santé publique du Québec
20 045, chemin Ste-Marie
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)
H9X 3R5

Ministère de la Santé et des Services communautaires
520, rue King, Place Carleton
C.P. 5100
Frédéricton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G8

Public Health Services
Department of Health
1690 Hollis Street, 11th Floor
P.O. Box 488
Joseph Howe Building
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2R8

Department of Health and Social Sciences
P.O. Box 2000, Jones Building
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7N8

Newfoundland Department of Health
Disease Control and Epidemiology
West Block, Confederation Building
P.O. Box 8700
St. John's (Terre-Neuve)
A1B 4J6